



## สิงโตเหยี่ยว

ชื่ออื่นๆ :

*Bulbophyllum longerepens* Ridl.

ช่วงระยะออกดอก : พฤษภาคม-มิถุนายน

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง เหง้าเลื้อยอยู่เหนือวัสดุที่เกาะ โดยมีรากกิ่งอากาศแข็งที่ออกจากใต้ลำลูกกล้วย 2-3 เส้น ค้ำยันเหง้าและลำลูกกล้วยไว้ เหง้ากลมแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 ซม. ปกคลุมด้วยกาบแห้ง ลำลูกกล้วยอยู่ห่างกัน 2.5-4 ซม. และมีข้อ 3-4 ข้อ ลำลูกกล้วยสีเขียวอ่อนทรงกรวยหรือรีแบน กว้าง 0.8 ซม. ยาว 2.1 ซม. ที่ปลายมีใบ 1 ใบ โคนใบปิด แผ่นใบบางรูปขอบขนาน กว้าง 1.7-2 ซม. ยาว 5-6 ซม. ปลายใบมน หักเว้าตื้นๆ **ช่อดอก** เล็ก ออกที่ข้อหรือที่โคนลำลูกกล้วย ครั้งละหลายๆ ช่อ ก้านช่อดอกยาว 1-1.5 ซม. มีกาบบางๆ หุ้ม **ดอก** ออกเป็นกระจุกที่ปลาย 2-6 ดอก ขณะบานมีกลิ่นหอม ใบประดับดอกแหลมบาง ยาวใกล้เคียงหรือสั้นกว่าก้านดอกย่อย ดอกสีเขียวอ่อนแกมเหลือง กว้าง 0.8 ซม. **กลีบเลี้ยงบน** รูปสามเหลี่ยมฐานกว้าง 0.1 ซม. ยาว 0.3 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** กว้าง 0.1 ซม. ยาว 0.45 ซม. **กลีบดอก** รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลม กว้าง 0.1 ซม. ยาว 0.2 ซม. **กลีบปาก** รูปสามเหลี่ยมปลายมน โค้งเล็กน้อย กว้างไม่ถึง 0.1 ซม. ยาว 0.15 ซม. ด้านบนนูน ด้านล่างลึกเป็นร่องเส้าเกสรสั้น ยอดเกสรเพศเมียแยกกว้าง ฝาครอบกลุ่มอับเรณูรูปครึ่งวงกลม



**ถิ่นที่อยู่ :** พบตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 550-1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล