



เอื้องเหิยหะหาวศรี

Coelogyne tenasserimensis Seidenf.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต จ.พังงา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 550 - 850 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มีนาคม - สิงหาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 1.5-5 เซนติเมตร ยาว 7.5-30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจจะ จำนวน 4-6 ดอก โคนมีกาบใบ หุ้ม ดอก บานเต็มที่กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร สีเขียวแกมเหลือง กลีบปาก สีน้ำตาลแกมเหลือง มีแต้มสีน้ำตาล กลีบเลี้ยง รูปใบหอก แกมขอบขนาน กลีบดอก รูปแถบ กลีบปาก รูปไข่ แยกเป็น 3 พู ทุกกลีบปากรูปสามเหลี่ยม กลีบปากพูกกลางรูปไข่กลับ ปลายกลีบมน กลมหรือเว้าบวม ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น ตรงกลางกลีบมีสัน 3 สัน สันกลางสั้นมาก สันด้านข้างยาวเกือบจรดปลายกลีบ พบตามป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้