



เอื้องกลีบติดขวา

ชื่ออื่นๆ :

Gastrodia javanica (Blume) Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เหา้าน้ำตาลอ่อน รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ต้นสีน้ำตาลเข้ม ตั้งตรง กลมและเปราะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2-3.5 มม. ยาว 30-60 ซม. ไม่แตกแขนง ใบ ลดรูปเป็นเกล็ด สีน้ำตาลเข้ม รูปคล้ายหลอด ยาว 6-7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม จำนวน 5-8 ใบ **ช่อดอก** ตั้งตรง ไม่แตกแขนง ดอกในช่อ 10-20 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ำตาลเข้ม รูปไข่กลับ กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่นใบเกลี้ยง ติดทน **ดอก** สีเหลืองแกมน้ำตาลรูปคล้ายคนโท กว้าง 2-2.5 ซม. **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** เชื่อมติดกันประมาณ 3/5 ของความยาวกลีบ **กลีบเลี้ยงด้านข้าง** เชื่อมติดกับกลีบดอกและอีกด้านแยกอิสระ มีสันตามแนวยาว 3 สัน เห็นชัดทางด้านนอก **กลีบเลี้ยง ด้านนอก**สีเหลืองแกมม่วง ด้านในสีน้ำตาลแกมเหลือง รูปรี กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 1.3-1.6 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ผิวด้านนอกมักไม่เรียบ **กลีบดอก** ด้านนอกสีเหลือง ด้านในสีขาว รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 1.2-1.4 ซม. โคนสอบ ปลายมน อยู่บนกลีบเลี้ยง **กลีบปาก** สีเหลือง ด้านล่างมีเส้นกลาง กลีบสีเขียวยาวตามแนวยาว รูปรีแกมรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด กว้าง 6-7 มม. ยาว 1-1.5 ซม. ขนานไปกับเส้าเกสร มี 3 แฉก แฉกข้างตั้งชัน สูง 1.5-1.7 มม. ปลายมน แฉกกลางกว้าง 1.5-2 มม. ยาว 3.5-3.7 มม. ปลายมน โค้งออกด้านนอกเล็กน้อย ส่วนโคนมีกลุ่มเนื้อเยื่อรูปกลม ขนาด 0.4-0.6 มม. เส้าเกสรสีเหลือง กว้าง 2.4-2.6 มม. ยาว 7-8 มม. คางยาว 5-6 มม. ปลายแผ่ออกเป็นปีก กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1-1.5 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.8-1 มม. ฝากรอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปไข่ กว้าง 2-2.2 มม. ยาว 1.9-2 มม. ยอดเกสรเพศเมียเป็นแฉ่ง รูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่สีน้ำตาลเข้ม ก้านดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 1-1.4 ซม. รังไข่ส่วนที่ป้องกัน กว้าง 3-3.3 มม. ฝัก ไม่พบ



ถิ่นที่อยู่ : พบขึ้นเป็นกลุ่มบนพื้นดิน ที่มีแสงน้อย ที่ความสูง 300-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ที่ จ. สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา นราธิวาส

