

เอื้องกลีบม้วนเขานั่น

ชื่ออื่นๆ :

Liparis rubescens Tetsana, H.A.Pedersen & Sridith

ช่วงระยะออกดอก : มิถุนายน-สิงหาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้ดิน เจริญทางช้าง มีลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก โคนลำรูปกระสวย ขนาด 0.6-0.8x12-6 ซม. มีหลายข้อปล้อง เจริญขึ้นมาเหนือพื้นดิน ลำใหม่จะออกที่โคนลำลูกกล้วยเดิม มีใบติดที่ส่วนปลายลำ 3-5 ใบ เรียงสลับ อาจเรียงระนาบเดียว ก้านใบ ยาว 2.5-3 ซม. เป็นร่องด้านบน แผ่นเป็นกาบหุ้มลำต้น **ใบ** รูปไข่ ถึงรูปรี ขนาด 4.5-5.5x7-12 ซม. บาง นุ่ม เป็นรอยพับจีบตามยาว มีเส้นใบ 5-6 เส้น ขอบเรียบถึงเป็นคลื่น ปลายใบเรียวแหลม **ดอก** ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ตั้งขึ้น ช่อดอก ยาว 20-25 ซม. ออกดอกหลวมๆ 15-20 ดอก ก้านช่อดอกรูปทรงกระบอก หักงอ มักเป็นครีบทามยาว ยาวประมาณ 10 ซม. แกนช่อดอกยาว 10-15 ซม. เป็นครีบทาม ใบประดับ รูปใบหอกกว้าง ยาว 3.5-4.5 มม. โค้งกลับ ติดทนนาน ดอกย่อยพลิกกลับ วงกลีบสีม่วงอมเขียว แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมแดง **กลีบเลี้ยง** เกี้ยง มีเส้นลายดอกตามยาว 3 เส้น (บางครั้ง 5 เส้น) กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนานแกมใบหอก ขนาด 2x10 มม. **กลีบเลี้ยงคู่ล่าง** รูปใบหอกแกมรูปเคียวกว้างๆ ขนาด 2.5-3x7-8 มม. ปลายเกือบแหลม กลีบดอกรูปแถบแคบๆ ขนาด 1x9-9.5 มม. โค้งงอตามยาว ขอบกลีบม้วนลง มีเส้นลายดอกตามยาว 1 เส้น **กลีบปาก** รูปเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสถึงสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 5.8-7x6.5-7 มม. บริเวณใกล้โคนฐานกลีบ หักห่อเป็นลอนทั้ง 2 ข้าง ก่อนที่แผ่นกลีบจะแผ่กว้างออก ปลายกลีบปากเว้าตื้นหรือตัดตรง ขอบกลีบด้านข้างและด้านปลาย จักเป็นฟันเลื่อยสั้นๆ ไม่สม่ำเสมอ เส้าเกสร สีขาวอมเขียว ยาว 4.5-5 มม. รูปทรงกระบอก โค้งมาหน้า ขอบด้านหน้าลำเส้าเกสรทั้ง 2 ข้าง พัฒนาเป็นครีบทามจากฐานถึงยอด



ถิ่นที่อยู่ : พบตามพื้นที่ที่มีการสะสมอินทรีย์วัตถุ ภายใต้ร่มเงา ในป่าดิบชื้น ที่ความสูงตั้งแต่ 900 เมตร จากระดับน้ำทะเล