



เอื้องกลีบม้วนเป็ยกบูน

ชื่ออื่นๆ :

Liparis rhombea J.J.Sm.

ช่วงระยะออกดอก : พฤษภาคม-มิถุนายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง กอเป็นกระจุกแน่น รากถึงอากาศ ลำลูกกล้วยรูปไข่แบน กว้าง 0.2 ซม. หนา 1.4 ซม. ยาว 1.5–3.5 ซม. ที่โคนมีกาบไม่เท่ากันหุ้ม 2 กาบ บนยอดมี ใบ เพียง 1 ใบ รูปรี กว้าง 0.8–3 ซม. ยาว 6–12 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบไม่มีก้าน **ช่อดอก** ออกที่ยอด สีเหลืองนวล ยาว 7–15 ซม. ก้านช่อดอกยาว 7–8 ซม. ที่โคนก้านมีกาบ 2 กาบ ดอกทยอยบานจากโคนสู่ปลายช่อ ใบประดับดอกแหลม สีเขียวอ่อน ยาว 0.4 ซม. ก้านดอกย่อยและรังไข่ยาว 0.8 ซม. **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** สีเขียวแกมเหลืองอ่อน พับกลับ **กลีบเลี้ยงบน** รูปขอบขนาน กว้าง 0.2 ซม. ยาว 0.5 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปขอบขนานแกมรูปรีขนาดใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยงบน **กลีบดอก** รูปแถบ กว้าง 0.1 ซม. ยาว 0.45 ซม. **กลีบปาก** รูปไข่กลับ สีเหลืองอ่อน ตรงกลางพาดด้วยแถบสีแดงอมส้ม กว้างและยาว 0.6 ซม. โคนตั้งขึ้นเกือบขนานกับเส้าเกสร ตรงกลางโค้งพับลง กลางปลายกลีบปากเว้าลึก แบ่งปลายกลีบปากออกเป็นสองซีก แต่ละซีกปลายกลมมนขอบหยักซี่ฟันละเอียด เส้าเกสรสีเขียวอ่อน สั้นกว่ากลีบปากประมาณครึ่งหนึ่ง ขอบไม่มีปีก ฝากรอบกลุ่มอับเรณูสีเขียว



ถิ่นที่อยู่ : พบตามริมน้ำ ในป่าดิบชื้น ป่าดิบเขาระดับต่ำ ที่ระดับความสูง 400-1,300 เมตร