



เอื้องกลีบนิ้วนปากส้ม

ชื่ออื่นๆ :

Liparis condylobulbon Rchb.f.

ช่วงระยะออกดอก : กรกฎาคม-ธันวาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม่มีอิงอาศัย ขึ้นชิดติดกันเป็นกอ หัวเทียม สีเขียวอ่อน รูปไข่แกมรูปขวด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ยาว 3.5-4 ซม. ผิวมันเงา ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 5-6 ซม. จำนวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนที่มีหัวเทียม ใบ สีเขียวอ่อน รูปแถบแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 13-15 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่นใบบาง มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน จำนวน 1 ใบ **ช่อดอก** เกิดที่ยอดที่จะเจริญไปเป็นหัวใหม่ ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 10-20 ซม. ดอกในช่อ 20-25 ดอก ทอยบานจากโคนไปสู่ปลายช่อ ใบประดับย่อย สีขาว รูปใบหอก กว้าง 1-2 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม **ดอก** สีเขียวแกมเหลือง กว้าง 3-4 มม. กลีบเลี้ยงมีเส้นตามยาว 3 เส้น เห็นชัดทางด้านนอก **กลีบเลี้ยงบน** รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-0.8 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม **กลีบเลี้ยงข้าง** รูปรี กว้าง 0.9-1.2 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. โคนเป็นแฉ่ง ปลายมน **กลีบดอก** รูปแถบ กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. โคนสอบ ปลายมน มีเส้นตามยาว 1 เส้น **กลีบปาก** รูปขอบขนาน กว้าง 0.9-1.3 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. โคนเป็นแฉ่งตื้นๆ ปลายแยกเป็น 2 แฉกเว้าตื้น ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน เล้าเกสร สีเขียวแกมเหลือง กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 1.3-1.5 มม. กลุ่มเรณู แต่ละกลุ่มรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.4 มม. ฝากรอบกลุ่มเรณู สีเขียว รูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแฉ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเล้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 2.5-3 มม. ฝัก ไม่พบ



ถิ่นที่อยู่ : พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ที่มีแสงน้อย ที่ความสูง 400-450 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทางภาคใต้ที่ จ.สงขลา(โดนงาช้าง) ยะลา(เบตง)