



กล้วยปลวกม่วง

ชื่ออื่นๆ :

Stereosandra javanica Blume

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หัวใต้ดิน สีน้ำตาลอ่อน รูปไข่แกมรูปขอบขนาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ยาว 5-6 ซม. ต้น สีขาว แกมสีน้ำตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-2.8 มม. ยาว 15-20 ซม. ตั้งตรง ไม่แตกแขนง กาบใบ สีน้ำตาล รูปคล้ายหลอด ยาว 8-9 มม. โคนสอบ ปลายแหลม จำนวน 2-7 ใบ **ช่อดอก** ยาว 3-10 ซม. ดอกในช่อ 15-25 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ำตาล รูปใบหอก กว้าง 1-4 มม. ยาว 5-9 มม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่นใบเกลี้ยง **ดอก** สีขาว ปลายของกลีบเลี้ยง กลีบดอกและกลีบปาก มีสีม่วง กว้าง 7-8 มม. มีสันตามแนวยาว 3 สันทางด้านนอก **กลีบเลี้ยงบน** รูปสามเหลี่ยมแคบ กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 8-9 มม. โคนสอบ ปลายแหลม **กลีบเลี้ยงข้าง** รูปสามเหลี่ยมแคบ กว้าง 1.5-2.2 มม. ยาว 8-9 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลมคล้ายตะขอ จมูกเข้าหากัน ขอบเรียบ **กลีบดอก** รูปใบหอกแคบ กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 7-8.8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ **กลีบปาก** รูปใบหอกกว้าง กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 0.9-1 ซม. โคนสอบ ปลายมน ขนานไปกับเส้นเส้าเกสร โคนกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อรูปเกือบกลม 2 กลุ่ม ขนาด 0.5-0.7 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 3-3.5 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.5-0.6 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. ฝักรอบกลุ่มเรณู สีขาว รูปคล้ายอานม้าหรือรูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 1.2-1.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแฉ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. ยาว 3.5-4 มม. ส่วนที่ป้องกัน กว้าง 1.2-1.6 มม. ฝัก ไม่พบ



ถิ่นที่อยู่ : พบขึ้นเป็นกลุ่มตามพื้นป่า ที่มีแสงรำไร ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา