

ควายห้อย

Trichoglottis ventricularis Kocyan & Schuit.

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 1,100 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มิถุนายน - สิงหาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด รากอากาศ ต้นพอมแตกแขนงตั้งขึ้นหรือห้อยลง ทั้งต้นและรากพันกันยุ่ง ใบ เรียงตัวสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนใบเป็นกาบหุ้มต้น แผ่นใบเรียบ สีเขียวอ่อนแต้มด้วยสีม่วงแดง ช่อดอกสั้นมาก ออกที่ข้อ ออกครั้งละหลายๆ ช่อ แต่ละช่อมีดอก 1 ดอก ดอก สีเหลือง กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ ตัวกลีบเป็นร่องงอแง ปลายกลีบแหลม กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปใบหอกแกมรูปไข่ ตัวกลีบงอแงและเป็นร่องเช่นกัน กลีบดอก รูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม กลีบปากสีขาวเรียวแหลมโค้งขึ้น ตัวกลีบเป็นร่อง ปลายเว้าหยัก คล้ายซี่ฟันสั้นๆ 2 อัน กลีบปาก บาง ชัดตรง เดือยสีขาว บางใส ลักษณะคล้ายถุงเท้า ภายในมีขนยาว เป็นผนังกัน เล้าเกสรสีขาว ฝาคกรอบกลุ่มอับเรณูสีครีม ครอบกลุ่มอับเรณู 4 กลุ่ม พบในประเทศไทย และมาเลเซีย ตามป่าหินปูน ที่ความสูงถึง 1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล