

เอื้องสีลาสองใบ

ชื่ออื่นๆ :

Tainia bicornis (Lindl.) Rchb.f.

ช่วงระยะออกดอก : กุมภาพันธ์-มีนาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้ดิน เจริญทางช้าง มีเหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน ปล้องสั้นๆ แตกแขนงได้ มีลำลูกกล้วยเกิดที่ปลายเหง้า แขนงเหง้าใหม่จะออกที่โคนลำลูกกล้วย ส่วนแขนงช่อดอกออกทั้งที่โคนลำหรือข้อของเหง้า มีใบติดที่ปลายลำ 1 ใบ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ฐานบวมพองกว่าปลายเล็กน้อย ยาวประมาณ 12 ซม. ยืดยาว คดงอลงพื้น เกลี้ยง มักมีเศษกาบใบติดคาอยู่บ้าง ใบ รูปรีกว้างๆ บาง สีเขียวเข้ม มีเส้นใบหลัก 3 เส้น ออกจากฐาน แยกออกแล้วบรรจบกันที่ปลายใบ ขอบบิดเป็นคลื่น ปลายแหลม ก้านใบยาว **ช่อดอก** ตั้งตรง ยาว 45-60 ซม. ก้านช่อดอกสีม่วง มีใบประดับรูปสามเหลี่ยมยาวๆ ปลายเรียวแหลม แกนช่อดอกยาว 8-30 ซม. **ดอก** ย่อย 10-17 ดอก ดอกบานกว้างประมาณ 3.5 ซม. มักบานพร้อมกัน **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** สีเขียวอมเหลือง อาจแทรกด้วยแต้มเลอะสีม่วงมากหรือน้อย รูปร่างใกล้เคียงกัน รูปใบหอกแกมแถบ กลีบดอกมักบิดโค้งลงล่าง เป็นรูปตัว S **กลีบปาก** สีเหลือง มี 3 พู พูข้างหรือหูกีบรูปไข่ ตั้งขึ้น ปลายตัด มีจุดประสีม่วงกระจาย พูหน้าหรือปลายกลีบ รูปหัวใจกลับ ย่นมาข้างหน้า ปลายกลีบปากเล็ก ขอบกลีบบิดเป็นคลื่น กลางกลีบปากมีริ้วสีเหลืองสด 3 ริ้ว ยกเป็นสันจากโคนกลีบ 2 ริ้วข้าง หนาและสูงกว่า พาดตามยาวจากฐานกลีบถึงปลายกลีบ เส้นเกสรใหญ่ยาว โค้งมาหน้า มียางค์รูปจุดกลมมน สีม่วง 2 จุด ตอนปลายสุด

ถิ่นที่อยู่ : พบตามพื้นป่าในป่าดิบชื้น ป่าดิบชื้นเขาหินปูน ตั้งแต่ 200 เมตร