

ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. ลำต้นตรง กิ่งใหญ่ชูขึ้น แตกกิ่งมาก เปลือกสีน้ำตาลอมส้มอ่อน ถึงสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องละเอียด เปลือกในสีน้ำตาลแดง ไม่มียางขาวหรือน้ำเลี้ยง ใบ เดี่ยว ออกสลับ กว้าง 3-6.5 ซม. ยาว 6-19 ซม. รูปรีถึงขอบขนานหรือ รูปไข่กลับแคบปลายทู่หรือแหลม(อาจเป็นแฉ่งเล็กน้อย) โคนแหลม ขอบเป็นคลื่น จักซี่ฟันเป็นต่อม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน าดดอกมีน้ำยางเหนียว ใบแก่เป็นมันด้านบน กลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบหลักเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 7-11(20) คู่ ขนานกัน ค่อนข้างจาก เส้นใบย่อยเห็นไม่ชัด ก้านใบสั้นมาก ยาว 0.2-0.3 มม. โคนบวม หูใบเล็ก ยาวประมาณ 0.5 มม. ดอก สีขาวอมเขียวอ่อน ออกเป็นช่อหลวม ก้านช่อดอกยาว ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 6-14 ซม. แขนงแรกออกเป็นวงรอบข้อมี 4 กิ่ง ก้านดอกยาว 0.3-1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 1.5-2 มม. โคนเชื่อมกัน มีน้ำยางเหนียวปกคลุมอยู่ กลีบดอกแยก 5 กลีบ ยาว 2.5-4 มม. กิ่งโปร่งแสง เกสรเพศผู้มี 14-20 อัน เล็กเรียว ยาว 15-18 มม. ยาวกว่ากลีบดอกมาก และแผ่ออกไม่สม่ำเสมอ ติดที่ขอบจานฐานดอกเหนียว ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ยาวได้ถึง 10 มม. ยอดเกสรเพศเมียเป็นพู่เล็กน้อย ผล ยาว 1-2.5 ซม. รูปกรวยแกมรูปไข่ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงติดแน่น กลีบดอกอยู่ที่โคน มีน้ำยางเหนียวปกคลุม เปลือกบางแข็งแตกจากปลายลงมาเป็น 5 ซีก เมล็ดเล็กจำนวนมาก สีน้ำตาลอมส้ม ไม่มีปีก มีเยื่อหุ้มสีเหลืองเป็นง่ามที่โคน พบบ่อยในป่าดิบที่ต่ำ ส่วนมากใน ภาคใต้ตอนล่าง



ข้อมูลอ้างอิง : โชนอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2973>