

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอดใหญ่แผ่กว้าง ลำต้นตรง เมื่ออ่อนมีหนาม เปลือก สีเทาอ่อน เรียบ หรือแตกเป็นเกล็ด มีน้ำยางสีเหลืองอ่อนถึงสีส้มและมีสีน้ำตาลอมดำแทรก ใบ ออกดอกใกล้ปลายกิ่ง ใบย่อย 7-12 คู่ รูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนห่อหรือรูปหัวใจ ขอบเรียบ เกลี้ยง เส้นใบ 15-26 คู่ โค้งใกล้ขอบใบ ชัดทั้งสองด้าน ก้านใบย่อยเล็ก ยาว 0.7-1 ซม. ไม่มีหูใบ กิ่งก้านใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. เมื่ออ่อนมีหนาม ดอก ดอกเพศผู้ขนาดประมาณ 0.8 มม. สีชมพู อ่อน ออกเป็นช่อมีหลายดอก ยาว 20-45 ซม. ที่ซอกใบ ดอกย่อยไม่มีก้าน กลีบเลี้ยงยาว 3-4 มม. โคนเชื่อม กันเป็นท่อปลายจักเป็นพูยาว 1 มม. ด้านนอกเกลี้ยง กลีบดอกปลายหนา ด้านนอกเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 6 อัน ยาวประมาณ 7 มม. เชื่อมกันที่โคนขึ้นมาถึงครึ่ง ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมียไม่พบ ผล กว้าง ประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม. ออกเป็นช่อโปร่งยาว 20-30 ซม. รูปไข่ ค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยม เมื่อตัดขวาง ผนังผลชั้นในแข็งคล้ายหินเรียบ ภายในมี 1(2) เมล็ด พบกระจายในป่าดิบเดิมหรือป่ารุ่ม สูง 500 เมตร มักพบบนเขาหินปูนหรือที่ถูกแผ้วถาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา นราธิวาส



อ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาตุต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ ภาพประกอบ : <http://www.npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/2015-01-05-05-32-27/burseraceae/97-burseraceae?showall=&start=1>