

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงถึง 8 ม. เปลือก สีน้ำตาล อ่อนหรือสีน้ำตาลอมเทา เกลี้ยง เปลือกในสีครีมอมเหลืองอ่อน ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 4-8 ซม. ยาว 16-24 ซม. ปลายเรียวแหลมหรือแหลมสั้น โคนค่อนข้างสอบ ขอบโค้งกลับ เนื้อหนาคลายแผ่นหนังขุ่นและเกลี้ยง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน ฐานด้านล่าง เส้นใบเล็ก 12-16 คู่ เรียว ฐานเล็กทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยจาง ก้านใบใหญ่ยาวประมาณ 0.5 ซม. เป็นร่องด้านบน มีขน กิ่งอ่อนเกลี้ยงหรือมีขน ดอก สีเขียวอ่อนถึงสีขาวอมครีมหรือสีอมเหลืองมีแต้มชมพู กลิ่นหอม ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. ใบประดับเล็ก 3-4 ใบที่โคน กลีบเลี้ยงรูปไข่ยาว 0.4-1 ซม. ปลายแหลมแยกกัน มีขนด้านนอก เกลี้ยงด้านใน ไม้ติดทนจนเป็นผล กลีบดอกใบวงนอกรูปใบหอก ยาว 2.3-3 ซม. ปลายแหลมแยกกัน มีขนด้านนอก เกลี้ยงด้านใน วงในรูปไข่ยาว 1-1.7 ซม. ปลายแหลม โคนแคบคล้ายก้าน เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2.5 ซม. แกนเกสรเพศผู้แหลม เกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 มม. มีขน เกสรเพศเมียเล็ก ยอดเกสรเพศเมียเล็ก ยอดเกสรเพศเมียรูปกรวย ผลรูปรี ยาว 1-1.4 ซม. ปลายแหลมสั้น เกลี้ยง ผิวมันผลบาง แก่สีแดงถึงม่วง สุกสีดำ ไม่มีก้านผลหรือยาวถึง 1 ซม. ก้านช่อผลยาว 0.4-1.6 ซม. 1 เมล็ด พบเป็นไม้กระจายชั้นล่างในป่าดิบที่ต่ำ สูงถึง 300 ม. จ. ภูเก็ต ตรัง นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=7437>