

ชื่ออื่น : ดันหมี่ แร้ว หันตัน

ไม้พุ่มเล็กหรือไม้ต้นเป็นพุ่ม สูงได้ถึง 12(18) ม. มักแตกกิ่งได้โคน และแตกกุ่มเมื่อโดนโคน เปลือกสีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาลขุ่น เรียบหรือแตกสะเก็ด เปลือกในสีแดงเข้ม ใบ กว้าง 2.7-9 ซม. ยาว 7.4-24 ซม. ออกสลับ รูปรีถึงขอบขนานแกมรี ปลายเรียวแหลมยาว โคนกลมหรือเป็นแอ่งเล็ก มักเป็นแบบกึ่งกันปิดเล็กน้อย ประมาณ 2 มม. ขอบเรียบ ใบแก่ บางคล้ายกระดาษ มักย่นเมื่อแห้ง ด้านล่างสีเขียวเข้มขุ่น ไม่มีขนหรือเกล็ด ด้านล่างสีเขียวอ่อนหรือออกเทา ขนยาวทั่วไปบนเส้นใบ เส้นใบจากโคนใบ 3-5 เส้น เส้นใบข้าง 5-6 คู่ มีกลุ่มขนที่ง่ามเส้นใบ ก้านใบยาว 2.5-9 ซม. ปลายไม่บดขยี้ทั้งสองด้าน หูใบโค้งยาว ดอกเพศผู้ยาว 5-8 มม. สีขาวอมเขียวอ่อนถึงสีเหลือง ออกเป็นช่อสั้นไม่แตกแขนง ยาวได้ถึง 1 ซม. ตามกิ่งแก่หรือซอกใบ ช่อหนึ่งมี 2-6 ดอก ก้านดอกยาว 5-7 มม. ประใบดับยาว 1.5-4 มม. กลีบเลี้ยง 3(4) กลีบ ยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้ มีน้อยกว่า 200 อัน ยาวประมาณ 2.5 มม. ดอกเพศเมียยาว 12 มม. สีเขียวอ่อนถึงสีออกเหลือง ช่อดอกลดรูปเหลือดอกเดียวที่ปลาย ใบประดับหลายใบแผ่ออก กว้าง 1.2 มม. ยาว 4 มม. ก้านดอกยาว 0.7 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 6-8 มม. รังไข่ 3 ช่อง หนาแน่น ยอดเกสรเพศเมีย มี 3 อัน ยาว 12-22 มม. ก้านเกสรเพศเมียสั้นมาก ผล ยาว 1.8-2.5 ซม. สีเขียวอ่อน 3 พู มีขนกำมะหยี่ หนามนุ่มยาว ได้ 9 มม. พบในป่ารุ่มหรือป่าถูกทำลาย สูงถึง 500 มม. บนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ดินดา สัทิสสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

