

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 4-10(25) ม. เปลือกสีน้ำตาลถึงเทา แขนงกิ่งคล้ายทรงกระบอก มีขนสั้นหนา นุ่ม ละเอียดสีสนิมเหล็กเมื่อยังอ่อน แล้วเกือบเกลี้ยง ใบเป็นใบเดี่ยว ก้านใบยาว 1-2 ซม. พองเล็กน้อยที่โคนก้านใบ เกลี้ยง ใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก กว้าง 2.5-4.5 ซม. ยาว 7-14 ซม. คล้ายหนังบาง เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบ 4-7 คู่ ฐานใบมน ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลมหรือแหลมสั้น ช่อ ดอกออกตามง่ามใบหรือปลายกิ่ง เป็นช่อแยกแขนงแบบกระจุก ยาว 1.5-5 ซม. ก้านช่อและก้านดอก มีขน สั้น หนานุ่มละเอียด สีเหลืองปกคลุม ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 2-3 มม. มีขนสั้นหนานุ่มปกคลุม กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ รูปขอบขนานแกมใบหอก ยาว 6-7 มม. มีขนสั้น หนานุ่ม ปกคลุมทั้ง 2 ด้าน มีเกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน สมบูรณ์ 5 อัน และฝ่อ 5 อัน มีขนเป็นเส้นใยบางๆ ปกคลุม เกสรเพศผู้มีสีน้ำตาลสด เกสรเพศเมียมี 1 อัน เป็นทรงรูปไข่แบนข้างมีขนอยู่ปกคลุม ผลคล้ายรูป ไข่ มี รอยแตกแนวเดียว ขนาดผล 12-30 มม. มีขนสั้นนุ่มสีสนิมเหล็กปกคลุมหนาแน่น ปลายผลมีจอยย แต่ละผลมี 1 เมล็ด สีน้ำตาลดำ เป็นมันวาวเล็กน้อย ขนาด 1.5 มม. เยื่อหุ้มเมล็ดแตกเป็น 2 พู ที่ฐานเมล็ด ออกดอกเดือน ตุลาคม-มีนาคม และเดือนมิถุนายนของปีถัดไป พบมากในป่าที่อยู่บนภูเขาที่ไม่ชันมากนัก



ข้อมูลอ้างอิง: http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200011839
ภาพประกอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี