

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. เปลือกสีน้ำตาลอมเทา เรียบหรือแตกเป็นแผ่นตามแนวตั้งตื้นๆ เปลือกในสีส้ม มียางแดงตามกิ่งก้านแต่ไม่พบในลำต้น ใบ เดี่ยว ออกสลับดกที่ปลายกิ่ง รูปร่างรูปไข่กลับ กว้าง 7-13 ซม. พบบ้างที่กว้าง 7-17 ซม. ยาว 16-30 ซม. พบบ้างที่ยาวได้ถึง 46 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนหูถึงแหลม ขอบจักซี่ฟันแหลมห่างกัน 5-15 มม. ส่วนยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลอมส้ม ใบแก่คล้ายแผ่นหนังด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อนหรือสีออกเหลือง ปกคลุมด้วยขนรูปดาวหยิกบนเส้นใบหลักทั้งสองด้านหรือมีขนกระจายทั่วไป เส้นใบหลักจากโคนใบ 1 เส้น เส้นใบข้าง 17-19 คู่ โค้งเห็นชัด ไปจดที่ซี่ฟัน(ยกเว้นคู่ล่าง) เส้นใบยอดเป็นชั้นบันได ก้านใบยาว 3-16 ซม. มีขนปลายโค้งเล็กน้อยคล้ายเข่า และมีต่อมกลม 1 คู่ หูใบลดรูปเป็นต่อมกลมขนาดประมาณ 1 มม. ดอก สีครีมหรือสีเหลืองอ่อน สมมาตร แยกเพศรวมต้นหรือต่างต้น แต่ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างซีก ช่อดอกแตกแขนง เป็นช่อแคบที่ปลายยอด ยาว 20-40 ซม. กิ่งข้าง สั้น ยาว 1-2 ซม. มีขนรูปดาวทั่วไป ดอกเป็นกลุ่มเล็กที่ข้อใบประดับรูปสามเหลี่ยม ขนาด 2 มม. มีต่อมชัด ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กว้างประมาณ 2.5 มม. ยาวประมาณ 4 มม. เป็นบ่าตื้น ขนรูปดาวแน่นด้านนอก กลีบดอก 5 กลีบ แยกกัน กว้างประมาณ 2.5 มม. ยาวประมาณ 5 มม. จานฐานดอกจักเป็นพู มีขน เกสรเพศเมียมี 10-30 อัน อัน อัน นอกๆแยกกัน อันในโครงเชื่อมกัน ไม่มีรังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมียเป็นช่อแตกแขนงน้อยกว่ามีดอก 1-3 ดอกที่ช่อใบประดับ กลีบเลี้ยงมีปมที่ไหล่ ส่วนอื่นเหมือนดอกเพศผู้ กลีบดอกกว้างประมาณ 2 มม. ยาวประมาณ 4 มม. เกสรตัวผู้ 3 ช่อ ไม่เป็นสัน ยอดเกสรเพศเมียมี 3 แฉกแต่ละแฉกเป็น 2 ง่าม ผล กลม ขนาดประมาณ 2 ซม. ก้านผลยาว 1-1.5 ซม. ไม่มีร่องหรือสันมีขนสีน้ำตาลแน่น แก่แตกเป็น 3 ส่วนไม่เท่ากัน เมล็ดรูปรี กว้างประมาณ 12 มม. ยาวประมาณ 15 มม. แบน มีแต้มสีน้ำตาลเข้มและอ่อน ไม่มีเนื้อ พบกระจายในป่าดิบเดิม สูงได้ถึง 200 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : ไข่มอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

