

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 40 ม. เรือนยอดแน่น กิ่งล่างๆห้อยลง ไม่มีพุพอน แต่โคนใหญ่และแผ่ออกตามอายุ เปเลือก สีเทาอ่อนหรือสีน้ำตาลอ่อนครีม ไม่เรียบและแตกเป็นแผ่นหยาบ เมื่อแก่เริ่มเรียบและค่อนข้างหนา เปเลือกในสีชมพูถึงน้ำตาลแดง มียางใสแทรกอยู่ ในรูปรีแคบถึงรูปใบหอกแגםขอบขนาน กว้าง 2.5-8 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายแคบ โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ ต้นอ่อนมีขนเป็นไขแมงมุมกระจาย ใบแก่หนาคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน เส้นกลางใบแบบด้านบน ด้านล่างนูนเล็กน้อย เส้นใบ 7-11 คู่ โค้งเชื่อมกันเป็นวงใกล้ขอบใบ นูนทึ้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. มีต่อมสีน้ำตาลอ่อนหล่อลง 2 ต่อมซัดเจนใกล้ปลายทุ่นรูปใบหอก ยาว 5-10 น.m. อยู่ระหว่างโคนก้านใบ ร่วงเร็ว กิ่งก้านเล็กเรียว สีน้ำตาลเข้ม ซ่องอาการสีจางเห็นชัด ดอก ขนาดประมาณ 1.2 ซม. สีขาวอมเขียวจางถึงสีครีมอมเหลืองจาก สมบูรณ์เพศ ไม่สามารถซัดออกเป็นช่อแน่นยอดแบบที่ปลายกิ่ง กว้าง 6-12 ซม. ก้านดอกยาว 2-3 น.m. ฐานดอกขนาด 1.5-2.5 น.m. รูปกลูกช้างต้น เกลี้ยงหรือมีขัลละเอียดสีเทาด้านนอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 2-4 น.m. ไม่ค่อยเท่ากัน นุ่ม โคลงปลายทุ่น กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 3-6 น.m. ยาวเท่ากัน ขนกเกลี้ยง ไม่ติดแน่นเมื่อเป็นผล เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 25-35 อัน อยู่เป็นกลุ่มพันกัน ติดที่ขอบของฐานฐานดอกตรงข้ามรังไข่ ยาวกว่ากลีบดอก รังไข่ 2 ช่อง ติดที่ด้านหนึ่งของคอฐานดอก บนเส้นใหม่หนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียเล็กเรียวโคลง ยาวกว่ากลีบดอก มีขันที่โคน ผลรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2 น.m. ยาว 3-4 น.m. แบบเล็กน้อย โคนสอบ มีกลีบเลี้ยงติดแน่น สีเขียวอมเทา แก่สีเหลืองขุ่นแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนม่วงและม่วงดำ เหนียว ผนังผลชั้นในมีเม็ดใหญ่ 1(2) เม็ด พบร้าไว้ในที่ต่ำในภาคใต้ ทั้งป่าเดิมและป่ารุน ดอกกลิ่นเหม็นคล้ายนมบุด



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์เดนเซอร์ พินดา ลีฟฟิล์มูนทร์ กองการคาด ขยายตื้น น้ำป่าภาคใต้ เชียง - ห้องครัวที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดเก็บปีบไป. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Maranthes+corymbosa>

