

ไม้ต้นหรือไม้ต้นเล็ก สูง 4-16 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางยาวได้ถึง 39 ซม. เปลือกเรียบ เปลือกด้านในสีเหลือง กิ่งอ่อนสั้นหรือเรียวยาวคล้ายทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. เมื่อแห้งมีสีน้ำตาลเข้มมากถึงสีดำ ส่วนปลายของตาเป็นรูปกรวย ไม่มีเกล็ดหุ้ม ยาว 2-4 มม. มีขนตรง เอียงชิดปกคลุมหนาแน่น ใบคล้าย แผ่นหนัง ออกตรงข้ามหรือกิ่งตรงข้าม รูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรีถึงรูปใบหอก กว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-12 ซม. ไม่หยิกย่น ไม่มีตุ่มใบ ด้านบนเป็นมันวาว มีขนเล็กๆ กระจายประปราย ทั้งด้านบนและด้านล่าง ขนตรงและเอียงชิดกับใบ สีเขียวสดเมื่อแห้ง ฐานใบกลมมนถึงรูปลิ้น ปลายใบแหลม มีเส้นใบหลัก 3 เส้น เส้นกลางใบเรียบ เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบบนทั้งสองด้าน ก้านใบอ่อนสั้น คล้ายทรงกระบอก เป็นร่องตื้นๆ ด้านบน เกือบเกลี้ยง ยาว 0.5 ซม. หนา 1-2 มม. ช่อดอกออกตามง่ามหรือใกล้ปลายกิ่ง เรียวยาว เมื่อแห้งเป็นสีดำ ช่อดอกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง และแตกแขนงได้ถึง 3 ชั้น ยาวได้ถึง 16 ซม. ก้านดอกย่อยเป็นเหลี่ยม มีขนสั้นตรง เอียงชิดปกคลุม ดอกมีขนปกคลุม เมื่อแห้งมีสีเทาเข้มและลื่น ก้านดอกย่อยเรียวยาว ยาว 3-5 มม. ฐานดอก รูปถ้วย สูง 1-3 ซม. กลีบเป็นพู่รูปวงรี มีขนดกแนบชิดทั้งสองด้าน ช่อผลยาว 8-12 ซม. ผลทรงรี หรือทรงไข่กลับ ปลายแหลม ขนาด 8x10 มม. ผลเป็นพืดติดทน มีกาบหุ้มผลเล็กน้อย มีขนแนบชิดปกคลุม ก้านผลเรียวยาว 3-4 มม. หนา 1 มม. มีขนเล็กๆ เอียงชิดปกคลุม พบในป่าเต็งรังและป่าดิบเขา สูงถึง 1,800 ม. มักอยู่ตามไหล่เขาและริมฝั่งแม่น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง: http://www.asianplant.net/Lauraceae/Cinnamomum_iners.htm
ภาพประกอบ: http://www.biotik.org/laos/species/c/cinin/cinin_08_en.html