

Garcinia nigrolineata Planch. ex T.Anderson

ชื่อภาษาไทย
ชื่อพื้นเมือง :

CLUSIACEAE

ไม้ต้น สูง 24 ม. เปลือก สีน้ำตาลเข้มแตกเป็นแผ่นเล็ก เปลือกในสีเหลืองอ่อนถึงสีมุกอมส้ม มีيان สีครีมหรือเหลืองบางๆ ใบ รีสีงูปีบหอก กว้าง 4-6 ซม. ยาว 14-18 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนแคบ เนื้อคล้ายหนังบาง มีจุดสีดำเล็กและลายด้านล่าง เส้นใบเล็กตรง ขานกัน โดยจะเชื่อมกันใกล้ขอบใบ บุนกะเพี้ยด ก้านใบเล็กยาว 1.5 ซม. กิ่งสีเทาอ่อน ดอกออกเพศผู้ยาว 1-1.3 ซม. สีเหลืองถึงครีมเป็นช่อ มี 3-9 กลุ่ม บนปุ่มเล็กแข็งบนกิ่งได้ต้าใบ ก้านดอกเล็กยาว 0.8-1.4 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 3 มม. สีครีมเนื้อ นุ่ม กลมโค้ง ด้านนอกเป็นสันเมื่อเป็นตาดอก กลีบดอก 4 กลีบ กว้าง 3-4 มม. ยาว 6-9 มม. คล้ายสายเข็มขัดปลายทุหรือแหลม ครึ่งบนโค้งกลับ เกสรเพศผู้จำนวนมากอยู่แน่นเป็นก้อนครึ่ง วงกลมตรงกลางดอก ก้านสันไม่มีเกสรเพศเมีย เป็นหมัน ดอกเพศเมียเดียวหรือ 3-5 กลุ่ม ตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า กลีบดอกกว้างและหนากว่า ยอดเกสรเพศเมีย 5-7 แฉก มีปุ่มเล็ก ผล ยาว 4-5 ซม. กลม ปลายยกขึ้น มียอดเกสรเพศเมียเป็นแผ่นคล้ายจาก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. มีสัน อาจ สุกสีเหลืองถึงส้ม เม็ดใหญ่ 5-7 เม็ด เนื้อบาง พบรินป่าที่ต่ำ ใกล้ชายฝั่ง หรือตามลำน้ำ สันเขา เขารินปุน จ. สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : ใจอน การ์เดนส์ คินคา สิทธิบุนทร กองการค้า ขยายมตุ, นีปภาวดี – ชนพืชริมที่ 1- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ปี 2558, 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

