

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูง 18 เมตร เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้น เปลือก สีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นแผ่นเล็กหรือเป็นร่องไม่เท่ากัน เปลือกในสีชมพูถึงแดงช้ำ มียางสีเหลืองข้นหรือครีมบางๆ ใบ เล็ก รูปรีถึงใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลม โคนรูปกลม เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวด้านบน แห้งสีน้ำตาลแดง เส้นใบเล็กประมาณ 8 คู่ ห่างกัน 7-15 มม. เป็นมุมแหลมแคบ มีเส้นแฉกตรงไปยังขอบใบ เส้นบนๆเชื่อม กัน นูนละเอียด เส้นใบย่อยเป็นร่างแหแน่นนูน ก้านใบยาว 1 ซม. กิ่งสีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเทา ไม่เป็นสัน ดอกเพศผู้เล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 ซม. สีครีมถึงเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อหลวมมี 2-9 ดอก ตามซอกใบ หรือบนปุ่มเล็ก แข็งตามกิ่งใต้ตาใบ ก้านดอก ใหญ่ ยาว 2-6 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบยาว 3.5 มม. สีครีมรูปไข่ กลีบดอก 4 กลีบ กว้าง 3 มม. ยาว 5 มม. กลมโค้งถึงขอบขนานกว้าง ปลายหู่หรือกลม บานออก ไม่โค้งกลับ เนื้อนุ่ม ขอบบาง เกสรเพศผู้ 15-30 อัน อยู่แน่นเป็นก้อนครึ่งวงกลมตรงกลางดอกบนก้าน เป็นแท่งสั้นอับเรณู 4 เซลล์ ก้านชูอับเรณูสั้น ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อกระจุกมี 3-5 ดอกตามซอกใบ หรือใต้ตาใบ ก้านดอกใหญ่ยาว 2 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 2 มม. ไม่เท่ากัน สีเขียวอมเหลืองรูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 4 กลีบยาว 3 มม. เกสรเพศเมียเป็นหมัน 4 อัน ยอดเกสรเพศผู้เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. คล้ายจาน จักเป็นแฉกตื้น 6 แฉกหรือเป็นชายครุย มีตุ่มเล็ก ผล ยาว 2-3 ซม. รูปไข่หรือกลม ปลายนูนพบ น้อยยอดแบน มีเกสรเพศเมียเล็กซ่อนอยู่ในแฉกเล็ก โคนบวม กลีบเลี้ยงไม่ชัด ไม่มีร่องหรือสัน เกือบ เปลือก บาง สุกสีเหลืองถึงสีส้มหรือแดง เมล็ดเล็ก 3-5 เนื้อหนา พบในป่าดิบสูง 600 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพผล/ดอก : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2929>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

