

ชิง (เตือฉิ่ง)

Ficus fistulosa Reinw. ex Blume var. *tengerensis* (Miq.) Kuntze

วงศ์ MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นเล็ก ไม้อาศัยไม้อื่น ไม้ผลัดใบหรือผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 15 เมตร เรือนยอดเปิดไม่เป็นระเบียบ เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลอมครีม เรียบหรือแตกสะเก็ด มีวงตามแนวราบคล้ายเป็นลูกตาใหญ่เมื่อยังอ่อน เปลือกในสีเหลืองอ่อน มียางออกสีครีมหรือออกน้ำตาลแทรกอยู่ประปราย ใบ กว้าง 4-14 ซม. ยาว 8-30 ซม. ออกสลับหรือกึ่งตรงข้าม เรียงเวียนหรือกึ่งแผ่แบน แต่ระนาบเดียวบนกิ่งเมื่อยังอ่อน ส่วนมากรูปขอบขนาน แกมรีถึงรูปไข่กลับ ปลายแหลมสั้นถึงเรียวแหลมยาว คันรูปลิ้นถึงทุ่หรือกึ่งรูปหัวใจ มักเบี้ยว ขอบไม่จักหรือจัก ชีพินไม่เป็นระเบียบ โดยเฉพาะใกล้ปลาย ยอดอ่อนสีชมพูถึงน้ำตาลอมแดง ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวเข้ม และเกลี้ยงด้านบน สีจางกว่าและเกลี้ยงหรือมีขนนุ่มกระจายบนเส้นใบด้านล่าง มักมีสีออกแดงบนเส้นใบและ ก้านใบ เส้นใบจากโคนเห็นไม่ชัด เส้นใบข้าง 6-10 คู่ เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันไดถึงกึ่งร่างแห ก้านใบยาว 2-8 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนนุ่มสั้น มีเกสรตัวผู้ใบยาว 1-1.8 มม. ร่วงเร็วถึงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 มม. เกลี้ยงหรือมีขน เล็กๆ เมื่อยังอ่อนกลวง หักง่าย ส่วนมากมีต่อมไขที่ข้อ ผล ขนาด 1.5-2.5 ซม. ออกเป็นช่อบนปุ่มแข็งหรือ ลำต้นใหญ่ ยาวได้ถึง 10 ซม. มะออกบนกิ่งใหญ่และลำต้น บางทีออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ที่ง่าม ใบโดยเฉพาะต้น ที่ยังอ่อนอยู่ ทรงกลมหรือคล้ายลูกแพร์ โคนมักแคบสั้นเป็นคอเรียวยาวได้ถึง 1 ซม. กิ่งเป็นสันเล็กๆ สุกสีเหลือง อ่อนถึงน้ำตาลอมแดงชุ่ม เกลี้ยง ไม่มีเกร็ดด้านข้าง ก้านผลยาว 1.2-5 ซม. เรียวเล็ก มีใบประดับรูปสามเหลี่ยม 3 ใบ ใกล้ปลาย พบมากในป่ารุ่นและป่าที่ถูกทำลายทั่วไปในภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพผล/ใบ http://www.plantsofasia.com/index/ficus_fistulosa/0-843

ภาพถ่ายก่อน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

