

## ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นใหญ่ สูงได้ถึง 27 ม. ลำต้นตรง เส้นผ่านศูนย์กลางยาวได้ถึง 60 ซม. ไม่มีพุ่มพอง เปลือก สีเทา อ่อนถึงน้ำตาลอมเทา แตกเป็นสะเก็ดหรือเป็นแผ่น เมื่อแก่จะแตกเป็นร่องหยาบ เปลือกในสีส้มถึงส้มชมพู มีขีดสีแดงเข้ม หนาและนุ่ม มีน้ำเลี้ยง เหนียวสีคล้ายน้ำผึ้ง หรือสีเหลืองอมครีมกระจาย ใบ รูปขอบขนานแคบ ถึงรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 9-14 ซม. ส่วนกว้างที่สุดอยู่ใกล้โคน ปลายทู่หรือแหลม โคนรูปปลีมนกว้าง ถึงเกือบกลม มักเบี้ยวเล็กน้อย ใบอ่อนมีขนสีสนิมบนเส้นกลางใบทั้งสองด้าน ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบ เส้นกลางใบเล็กเรียว ฐานขนบนเล็กน้อย มีร่องตื้นไปยังโคน เส้นใบข้างชิดกัน ไม่เป็นระเบียบ ค่อนข้างจาง ทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1.5-2 ซม. เล็กเรียว มีขนสีสนิมกระจายเมื่อยังอ่อน กิ่งอ่อนมีขนกำมะหยี่สีสนิม ตาที่ ปลายยอด รูปกรวยแคบ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อกระจะไม่แตกแขนง ยาว 3.5-7 ซม. ที่เหนือ ช่อใบเล็กน้อย มี 12-20 ดอก มีขนสีสนิมใกล้โคนก้านช่อดอก ก้านดอกยาวถึง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบคู่นอกกลม ยาว 3-4 มม. มีขนสีน้ำตาลด้านนอก กลีบคู่ในบางกว่าและคล้ายกลีบดอก กลีบดอก 2-4 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 3-4 มม. ยาว 5-8 มม. ผล กลมถึงรูปไข่ กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 3-4.5 ซม. ปลายกลม มียอด แหลมเล็กเป็นก้านเกสรเพศเมีย เกือบ เปลือกหนาเหนียว เมื่อสุกสีเขียวถึงสีดำอมม่วง แห้งสีน้ำตาลอมม่วง ชุ่มและเหนียว พบในป่าดิบหรือป่าดิบผสมป่าไผ่ความสูง 100-200 ม. จังหวัดระนอง พังงา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ฟินลา สัทธินทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาควิไล เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพผล : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/15416129127/in/photostream/>

ภาพใบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3658>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

