

ชื่ออื่น : กะเฮอ ชงโค สะเปชี เลี้ยวดอกแดง เลี้ยวหวาน

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ใบรูปเกือบกลม กว้างและยาวประมาณ 12 ซม. ปลายแฉกลึกเกือบถึงหนึ่งแผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย เส้นโคนใบข้างละ 4-6 เส้น ก้านใบยาว 2-3 ซม. ช่อดอกมี 6-10 ดอก ก้านดอกหนา ยาว 1-1.5 ซม. ใบประดับย่อยติดประมาณกึ่งกลางก้านดอก าดอกรูปกระบอง มีสันนูน 4-5 สัน ยาว 3-4 ซม. มีขนกำมะหยี่หนาแน่น ฐานดอกยาว 0.7-1.2 ซม. ดอกสีชมพูหรือม่วง กลีบรูปใบหอก ยาว 3-5 ซม. ก้านกลีบยาว 0.5-1 ซม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาวเท่า ๆ กลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน 3-4 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 5-6 อัน รูปเส้นด้าย ยาว 0.6-1 ซม. รังไข่มีขนกำมะหยี่หนาแน่น ก้านเกสรเพศเมีย โค้งงอ ยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ฝักรูปแถบ ยาว 20-30 ซม. มี 10-15 เมล็ด

เข้าใจว่ามีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบเก็บจากฟิลิปปินส์ ในไทยพบปลูกตามสองข้างถนนและสวนสาธารณะ พบน้อยที่กระจายในธรรมชาติ ส่วนชงโคที่ปลูกเป็นไม้ประดับและไม่ติดผล เกสรเพศผู้ 5 อัน เป็นหมัน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเกาะฮ่องกง ชื่อสามัญคือ Hong Kong orchid tree ชื่อวิทยาศาสตร์คือ *Bauhinia x blakeana* Dunn เป็นลูกผสมของ *B. purpurea* L. และ *B. variegata* L. คำระบุชนิดตั้งตาม Sir Henry Arthur Blake ผู้ปกครองเกาะฮ่องกงช่วงปี ค.ศ. 1989-1993



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Bauhinia0purpurea0L>

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Bauhinia+purpurea>

