

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น บางครั้งพบเป็นพุ่มเล็กน้อย สูงได้ถึง 50 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางยาวได้ถึง 80 ซม. บางครั้งมีพูพอน เปลือก สีน้ำตาลซีดหรือเทา เรียบ กระพี้สีขาวอมเหลือง กิ่งแบนเรียบ ไม่มีตา เกี้ยง หรือตาออกตามง่ามกิ่ง เป็นกลุ่ม 2-4 ตา ตาด้านบนจะใหญ่ที่สุด ขนาดยาว 2 มม. ใบ เกี้ยง เรียบ สีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลแดงด้าน บน บางครั้งด้านล่างคล้ายขี้ผึ้งและไม่มีปุ่ม ใบรูปไข่กลับถึงรูปรี กว้าง (1)2-7 ซม. ยาว (2.5)4-14 ซม. ฐานใบ มนหรือรูปลิ้น ปลายใบยาวแหลมหรือถึงเรียวแหลม ส่วนปลายสุดของใบมน เส้นกลางใบด้านบนเป็นร่อง เส้น แขนงใบ 5-7 คู่ ไม่บรรจบกับขอบใบ นูนเล็กน้อย เส้นแขนงใบย่อยเป็นแบบร่างแหหยาบ มีตุ่ม 0-10(20) กระจายหรืออยู่ใกล้ฐานใบและกลางใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.5 มม. ก้านใบยาว 3-10 มม. มีรอยย่นตาม ข้างหรือเกี้ยง ไม่มีตุ่ม ดอก ออกเป็นช่อ 6-14 ดอก แกนช่อดอกมีขนหรือค่อนข้างเกลี้ยง ใบประดับช่อดอก เล็กและร่วงง่าย ดอกสีแดงเมื่อแห้ง ก้านดอกยาว 5-15 ซม. มีขนแบบขนแกะหนาแน่นกลีบเลี้ยงมีขนปกคลุม ละเอียดทั้งสองด้านหรือเกือบเกลี้ยง กลีบเลี้ยงด้านนอก ยาว 2-3 มม. ด้านในยาว 3-4.5 มม. กลีบดอก 7-11 (12) มม. สีขาว กลีบดอก 3 อัน มีจุดสีเหลืองตรงกลาง สีคล้ำเมื่อแห้ง ด้านนอกเกลี้ยง ด้านในมีขนคล้ายขน แกะปกคลุมที่ฐานและปลายกลีบดอก ก้านอับเรณูแยกจากกัน ยาว 11-13(16) มม. ปกคลุมด้วยขนคล้ายขน แกะสั้นหรือส่วนปลายเกลี้ยง อับเรณู ยาว 0.8 มม. เกี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยที่ฐาน รังไข่เกลี้ยงหรือมีขนคล้าย ขนแกะปกคลุมหนาแน่น ตัวเมื่อแห้ง ผลทรงกลม เกี้ยงหรือมีขนเล็กน้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ซม. บางครั้งเป็นหมัน มีก้านผลสั้นหรือยาว สีดำเมื่ออ่อน สีเหลืองหรือส้มเมื่อสุก พบบ่อยคล้ายขี้ผึ้งสีน้ำตาลเงิน ผนังผลเรียบ หนา 5-15 มม. ก้านผลยาว (5)10-15 มม. ก้านผลมีขนาด 2-4 มม. มี 4-12 เมล็ดในหนึ่งผล พบในป่าที่ยังไม่ถูกทำลายบริเวณเนินเขาหรือสันเขา ตลอดถึงริมแม่น้ำ ป่าพรุ ความสูง 1,500 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : Tree flora of Sabah and Sarawak volume 6

ภาพประกอบ : <http://134.76.19.22/sumatra/taxa/Polygalaceae/Xanthophyllum%20stipitatum>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

