

Xanthophyllum griffithii Hk. F. var. *curtisii* (King) Ng

ชุมแสงง่ามใบหนาม วงศ์ POLYGALACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

สูงได้ถึง 27 ม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 40 ซม. เปลือกสีเทาหรือน้ำตาล เรียบ กระพี้สีเหลืองจาง กิ่งเรียบ เรียวยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. ไม่มีตุ่มปุ่ม เกี้ยงหรือมีขนประปราย ตาที่เกิด ตามง่ามกิ่ง ไม่มีก้านตา เห็นค่อนข้างชัด ยาว 3-10 มม. มีขนปกคลุม เกี้ยงหรือค่อนข้างเกี้ยง ใบ เกี้ยง มีหลายเฉดสี เรียบ สีเข้มเข้มถึงสีน้ำตาลหลังใบ ท้องใบสีสว่างกว่า อาจมีนวลหรือมีตุ่มใต้ใบ แผ่นใบรูปไข่รูปขอบขนานแกมรูปไข่หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 4-10 ซม. กว้าง 1-5 ซม. โคนใบเป็นรูปลิ้น ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม อาจพบเป็นติ่ง เป็นกลางใบ เรียบหรือขนเล็กน้อยด้านหลังใบ เส้นแขนงใบ 4-6 คู่ เส้นแขนงใบบรรจบกันก่อนถึงขอบใบ เส้นแขนงใบย่อยสานกันเป็นร่างแห มีตุ่มกระจายอยู่ในแผ่นใบ 4-20 ตุ่ม มักจะอยู่ใกล้เส้นกลางใบ ขนาด 0.2-0.3 มม. ก้านใบ 5-12 มม. เกี้ยง มีริ้วรอยตามขวาง อาจพบตุ่ม 1-2 ตุ่ม ตรงส่วนใบก้านที่ติดฐานใบ ดอก ออกเป็นช่อ ยาวได้ถึง 10 ซม. มักจะแตกเป็นเป็นกิ่งย่อย ก้านช่อดอกสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาล เกี้ยง มีขนสั้นปกคลุมประปรายหรือค่อนข้างหนาแน่น ใบประดับช่อดอกออกตรงข้าม ดอกย่อย ก้านดอกย่อย 1.5-4.5 ซม. กลีบเลี้ยงด้านนอก 1.5-2.5 มม. ด้านใน 2.5-3.3 มม. กลีบดอกสีขาว กลีบดอกส่วนที่อยู่บนมีจุดสีเหลืองหนึ่งจุด เมื่อแห้งสีแดงเข้ม กลีบที่ยาวที่สุด 6.5-10 มม. มีลักษณะเป็นเส้นคล้ายก้านดอก ส่วนกลีบดอกอื่นจะเกี้ยงหรือมีขนปกคลุมเฉพาะส่วนปลาย ผลรูปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. ผิวเรียบสีน้ำตาล มีขนปกคลุมโดยรอบหรือเกี้ยง ก้านผลยาว 2-4 มม. ผลมี 1 เมล็ด พบกระจายทั่วไปในภาคใต้จนถึงมาเลเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : แปลจาก : Tree flora of Sabah and Sarawak volume 6

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

