

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ เรือนยอดแน่น ลำต้นกลมตรง มีพูพอนเล็ก ใบ เดี่ยว ออกสลับ ขอบเรียบ มีนวล ด้านล่าง มักมีต่อมเล็กเป็นแอ่งโตเฉพาะตามซอกเส้นใบด้านล่าง เกือบและเป็นมัน ค่อนข้างบวมตามข้อ มักมีตามมากกว่า 1 ตาที่ง่ามใบหรือเหนือง่ามใบ ไม่มีหูใบดอก สีขาวถึงเหลือง หรือออกชมพู คล้ายดอกถั่ว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกกัน คูโนใหญ่กว่าและไม่ว่ากลีบดอก กลีบดอก 5 กลีบ แยกกัน คู่บนมักโค้งไปด้าน หลัง กลีบล่างรูปเรือมีโคนแคบ หุ้มเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้มี 8 อัน อยู่รอบจานฐานดอกรูป วงแหวน แยกกัน 2 อัน อีก 6 อันเชื่อมกับโคนกลีบดอก เกสรเพศเมียเรียวกัง 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียมี 2 พู ยาวเกือบเท่าเกสรเพศผู้ ผลมีเนื้อบางถึงกึ่งแข็ง ไม่แตก เมล็ดมีหนึ่งถึงจำนวนมาก ไม่มีเนื้อหุ้ม - มี +- 94 ชนิด พบในอินเดียและจีนตอนใต้ พบ 12 ชนิด มักพบในป่าดิบที่ไม่ถูกทำลาย กิ่งมักบวมที่ข้อ มีต่อมเป็นรู ขนาด +- 0.5 มม. ข้อดอกไม่แตกแขนง มีขนประปราย กลีบดอกยาว +- 14 มม. แห้งสีน้ำตาล รังไข่และก้าน เกสร เกือบ ผลมี 8-16 เมล็ด ไม้ต้นสูง ใบกว้าง 2-7.5 ซม. ยาว 5-19 ซม. รูปไข่ถึงรี ปลายกลมหรือ เรียวแหลม โคนรูปลิ้ม ขอบเป็นคลื่น เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบ 5-9 คูไม่มีเส้นขอบใบ ดอกสีขาว ก้านดอกยาว +-5 มม. กลีบเลี้ยงยาว 4-6 มม. เกสรเพศผู้ยาว +-8 มม. ผลมีขนาดได้ถึง 10 ซม. ทรงกลม เกือบ

พบในป่าดิบ สูงได้ถึง 1000 ม. จ. นครศรีธรรมราช



Copyright © NParks Flora&FaunaWeb

อ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพดอก : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=3199>ภาพผล : <https://www.flickr.com/photos/adaduitoka/27247130099/in/photostream/>

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

