

ไม้ต้นสูงได้ถึง 27 ม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 40 ซม. เป็นอกสีเทาหรือน้ำตาล เรียบ กระพี้สีเหลือง จิงกิ้งเรียบ เรียวๆ ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 นิ้ม. ไม่มีตุ่มปุ่ม เกลี้ยงหรือมีขับประปราย ตาที่เกิด ตามจั่งกิ้ง ไม่มีก้านตา เห็นค่อนข้างชัด ยาว 3-10 นิ้ม. มีขันปักคลุ่ม เกลี้ยงหรือค่อนข้างเกลี้ยง ใน เกลี้ยง มีหลายเดสี เรียบ สีเข้มเข้มถึงสีน้ำตาลหลังใน ห้องใบสีสว่างกว่า อาจมีนวลหรือมีตุ่มใต้ใบ แผ่นใบรูปไข่รูปขอบขนาน แกรมรูปไข่หรือรูปแกรมรูปขอบขนาน ยาว 4-10 นิ้ม. กว้าง 1-5 นิ้ม. โคนใบเป็นรูปลิ่ม ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม อาจพนเป็นติ่ง เป็นกลางใบ เรียบหรืออนุนเล็กน้อยด้านหลังใบ เส้นแขนงใบ 4-6 คู่ เส้นแขนงใบบรรจบกันก่อนถึงขอบใบ เส้นแขนงใบย่อยسانกันเป็นร่างแท มีตุ่มกระจายอยู่ในแผ่นใบ 4-20 ตุ่ม มักจะอยู่ใกล้เส้นกลางใบ ขนาด 0.2-0.3 นิ้ม. ก้านใบ 5-12 นิ้ม. เกลี้ยง มีริ้วรอยตามขวาง อาจพบรุ่ม 1-2 รุ่ม ตรงส่วนใบก้านที่ติดฐานใบ ดอก ออกเป็นช่อ ยาวได้ถึง 10 นิ้ม. มักจะแตกเป็นกิ่งย่อย ก้านช่อดอกสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาล เกลี้ยง มีขันปักคลุ่มประปรายหรือค่อนข้างหนาแน่น ใบประดับช่อดอกออกตรงข้าม ดอกย่อย ก้านดอกย่อย 1.5-4.5 นิ้ม. กลีบเลี้ยงด้านนอก 1.5-2.5 นิ้ม. ด้านใน 2.5-3.3 นิ้ม. กลีบดอกสีขาว กลีบดอกส่วนที่อยู่บนมีจุดสีเหลืองหนึ่งจุด เมื่อแห้งสีแดงเข้ม กลีบที่ยาวที่สุด 6.5-10 นิ้ม. มีลักษณะเป็นเส้นคล้ายก้านดอก ส่วนกลีบดอกอื่นจะเกลี้ยงหรือมีขันปักคลุ่มเฉพาะส่วนปลาย ผลรูปทรง กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 นิ้ม. ผิวเรียบสีน้ำตาล มีขันปักคลุ่มโดยรอบหรือเกลี้ยง ก้านผลยาว 2-4 นิ้ม. ผลมี 1 เมล็ด พบระยะห์ทั่วไปในภาคใต้จนถึงมาเลเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : แม่ลาก : Tree flora of Sabah and Sarawak volume 6

ภาพประกอบ : ภาพใบ/ลำต้น : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Xanthophyllum+vitellinum>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

