

ไม้ต้นเล็ก สูง 15 ม. ใบ รูปขอบขนานถึงรูปใบหอกกลับ กว้าง 3.5-6 ซม. ยาว 14-20 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนทู่หรือค่อนข้างแหลม เนื้อคล้ายแผ่นหนัง ขนเกลี้ยงทั้งสองด้าน ยกเว้นบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบ 13-18 คู่ จางหายไปใกล้ขอบใบ ด้านล่างเป็นร่อง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได ค่อนข้างขนด้านล่าง ก้านใบยาวประมาณ 0.5 ซม. มีขน ดอกเพศผู้ สีขาว ก้านดอกยาว 2-5 ซม. มีขนแน่นสีน้ำตาลเข้ม กลีบเลี้ยงยาว 2-3 มม. รูปประฆัง ปลายจักลึกเป็นแฉกตรง 5 แฉก มีขนแน่นสีน้ำตาลดำด้านนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกยาว 2-2.2 มม. โคนเป็นหลอด ปลายจักลึกประมาณ 1/2 ของความยาว กลีบเป็น 5 แฉก หลอดกลีบมีขน สีน้ำตาลด้านนอก ด้านในเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 14-16 อัน ก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่เป็นหมันมีขนแน่น ดอกเพศเมีย สีขาว ดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 3-5 ดอกมักออกตามลำต้นใหญ่ ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงรูปประฆัง ปลายจักลึกยาวเท่ากับหลอดกลีบ เป็นแฉกตรง 5 แฉก ไม่พับจีบหรือขอบเป็นคลื่น มีขนด้านนอก เกลี้ยงด้านใน กลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย เกสรเพศผู้เป็นหมัน 4-5 อัน ก้านชูอับเรณูมีขนรังไข่ขนแน่น ก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน ผล กลม ขนาด 4-5 ซม. ปลายสองด้านค่อนข้างทู่ถึงแบน มีร่องตามแนวตั้ง มีขนเมื่ออ่อน สุกสีน้ำตาลเข้ม

พบในป่าดิบที่ต่ำ สูงถึง 400 ม. จ. ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ตรัง



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ
ภาพประกอบ : <http://www.npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/def/ebenaceae/116-ebenaceae?showall=1&limitstart=>