


แดงพรุ

CHRYSOBALANACEAE

Parastemon urophyllus (A.DC.) A.DC.

ไม้ต้น สูงถึง 30 เมตร กิ่งเล็กสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเข้มเป็นมัน เปลือก สีน้ำตาลอมส้มถึงสีน้ำตาลแดง แตกเป็นร่องเล็กและเป็นแผ่น เปลือกในสีเหลืองอ่อน ใบกว้าง 2.4 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร รูปรีแคบถึงใบหอกแกมขอบขนาน เรียวไปยังปลายทั้งสองด้านยอดอ่อนสีน้ำตาลอมส้ม ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวมันด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่า เส้นใบเข้ม เกือบถึง มีต่อมเล็กสีน้ำตาลใกล้โคนเส้นกลางใบด้านล่าง เส้นกลางใบแบนด้านบนบนนูนเล็กน้อยด้านล่าง ลำง โคงแต่ไม่เชื่อมกันใกล้ขอบ เส้นร่างแหละเอียด ก้านใบยาว 0.5 เซนติเมตร เป็นร่องด้าน บนเกลี้ยง ไม่มีต่อม หูใบยาว 1 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยม ร่วงเร็ว ดอก ขนาด 0.3 เซนติเมตร สีขาว หรือสีเขียวอ่อนสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ เป็นช่อเล็กไม่แตกแขนง ยาว 4-14 เซนติเมตร ตามซอกใบหรือแตกแขนงกว้างที่ปลายกิ่ง แกนกลาง เกือบถึง ก้านดอกยาว 2 มิลลิเมตร ฐานดอกรูปถ้วย ด้านบนนอกเกลี้ยง ด้านในขนละเอียด กลีบเลี้ยง 5 กลีบอาจไม่เท่ากัน สีเขียวอ่อนเกลี้ยง ด้านใน กลีบดอกเล็ก 5 กลีบใส เกือบเท่ากลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 2 อันอยู่ติดกัน และ มีอีก 3 อันเล็กเป็นหมันติดตรงข้ามรังไข่ 1 ช่อ ติดที่โคนตรงกลางของฐานดอกมีขน ก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน ยอดแตก 3 ง่าม มีขนที่โคน ผล กว้าง 0.6 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร รูปรีมีกลีบเลี้ยงติดแน่นและเกสรเพศผู้เหี่ยวติดที่โคน เกือบถึง สุกสีชมพูภายในมีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด -พบในป่าพรุน้ำจืดหรือตามชายป่าดิบ จังหวัดพังงา สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1:- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.plantarium.ru/lang/en/page/image/id/561882.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)