

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ตัน

เปลือกสีน้ำตาลถึงสีเทาและมีรอยแตกจากฯ แบบร่างแท เปลือกในสีค่อนข้างเหลืองอมน้ำตาล มีตุ่มเล็กๆ เป็นจุดสีน้ำตาลเข้มใบถึงขอบ ใน มีรูปไข่แกมรีหรือรูปใบหอก ยาว 10-24 ซม. กว้าง 4-12 ซม. ขอบเรียบ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม คล้ายหนังบาง เกลี้ยงด้านบน มีขนสีเทาจางอยู่ด้านล่าง เส้นใบข้าง 8-12 คู่ เส้นใบย่อยเป็นร่างเหลวเอียงชัดเจน ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. มีใบเสี้ยงรูปหอกยาวประมาณ 1 ซม. ออกผลตามซอกแขนงกิ่งตรงที่ไม่มีใบหรือใบประดับ เป็นลูกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ก้านดอกทรงรี ดอกทรงกลม หรือรูปกลูกแพร์ ค่อนข้างແดวงหรือสัมเมื่อใบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. มี 3 ออวุล ก้านช่อดอกยาว 0.4-1 ซม. มีขนนุ่มสั้น ดอกเพศผู้มีกลีบเสี้ยง 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 1 อัน ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกัน รังไข่มีลักษณะเป็นปุ่มหุดเรียบ ทรงกลม ก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ด้านข้าง ยอดเกสรเพศเมียเป็นหลอด ดอกเพศเมีย มีกลีบเสี้ยง 4-5 กลีบ ปลายยอดเกสรเพศเมียเป็นหลอดทรงกระบอก ผลแห้งเมล็ดล้วน รูปขอบขนานเบี้ยว และมีรอยย่น ผลเกิดจากช่อดอก ที่มีรังไข่ของดอกแต่ละดอก รังไข่เหล่านี้กล้ายเป็นผลย่อยที่เชื่อมต่อแล้ว รวมกันแน่นเหมือนเป็นผลเดียว



ข้อมูลอ้างอิง : แหล่งมา : indiabiodiversity.org/species/show/266746

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

