

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงถึง 30 ม. ลำต้นเรียว ต้นแก่มีพูพอนเล็กๆ เปลือก สีน้ำตาลอมแดง ขรุขระ ลอกเป็นแผ่นไม่เท่ากัน ใบ กว้าง 3-6.5 ซม. ยาว 10-18 ซม. รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนทู่ เนื้อคล้ายหนังสีเขียวเข้มเป็นมัน และเกลี้ยงด้านบน ด้านล่างมีเกล็ดเล็กๆ สีเงินหรือสีทองแน่น เส้นใบ 9-14 คู่ เล็กเรียวและโค้ง จางทั้ง 2 ด้าน ดอก ยาว 5-6 ซม. สีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อมี 3-30 ดอก ก้านช่อยาวถึง 5 ซม. ตามกิ่งใหญ่มีก้อยู่ได้รอยแผลใบ กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2.5 ซม. รูปคนโท โคนคล้ายเป็นถุงแบน ปลายแยกเป็นพูสามเหลี่ยม 5 พู ยาวประมาณ 0.5 ซม. รูปไข่กลับถึงรูปช้อนกว้าง ปลายกลม โคนแคบ ตั้งตรง หรือ บานแผ่ ไม่ม้วน เกสรเพศผู้ แยกเป็น 5 กลุ่มๆ หนึ่งมีถึง 12 อัน ผล กว้าง 18-25 ซม. ยาว 20-40 ซม. รูป ไข่ ถึงรี หรือค้อยข้างกลม มีหนามแน่น ทรงปรีะมิดกว้าง ยาวถึง 1.2 ซม. แหลมรอบด้าน สีเขียวอมเทา หรือ ออกเหลือง ร่วงทั้งผลและแตกเป็น 5 เสี่ยงพบพื้นดิน แตงละเสี่ยงมีเมล็ด 2-3 เมล็ด กว้างถึง 2.5 ซม. ยาวถึง 4 ซม. มีเนื้อนุ่มสีออกเหลืองหุ้มมิด กินได้

-ปลูกเป็นพืชกินผลทั่วไปในภาคใต้ ไม่พบในธรรมชาติ อาจมีถิ่นกำเนิดมาจากเกาะสุมาตราหรือบอร์เนียว



ข้อมูลอ้างอิง: ไชยมอน การ์ดเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้เล่ม2 – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ: <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=2865>