

ทุเรียนผลแดง

MALVACEAE

Durio griffithii (Mast.) Bakh.

ไม้ต้นสูงได้ถึง 30 เมตร พุ่มพุ่มแคบชัน ใบ กว้าง 2-6.5 เซนติเมตร ยาว 6-13 เซนติเมตร ด้านล่างมีขนสั้นรูปดาว สีออกขาวแน่นซ้อนทับด้วยเกร็ดสีตะกั่ว เส้นใบ 6-9 คู่ โค้ง เป็นร่องด้านบน ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร มีเกล็ด ดอกเล็ก สีขาวหรือเหลืองอ่อน แก่สีอมส้ม ออกเดี่ยว (พบน้อยที่มี 2-3 ดอก) ตามซอกใบของกิ่งอ่อน กลีบเลี้ยงสีขาวอมเขียวอ่อน มีพู่รูปใบหอกกว้าง ออก 4 พู่ กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร กลีบดอก 4-8 กลีบ กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร รูปช้อนแคบหรือรูปแถบแคบ เกสรเพศเมียมี 5 กลุ่มชิด โคนไม่เชื่อมติดกัน อับเรณูเปิดโดยมีช่อง ก้านเกสรเพศเมียสั้นกว่าเกสรเพศผู้ ไม่มีขน ผล กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร รูปรีหรือรูปไข่ (กลับ) มีหนามเรียวแหลมยาว 2 มิลลิเมตร แก่สีออกแดง แตก 2-3 เสี่ยง แต่ละเสี่ยงมี 1-2 เมล็ด มีเนื้อบางสีส้มที่โคนเมล็ด

พบน้อยในป่าดิบ ที่ตำ จังหวัด ตรัง ยะลา



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยาฤต. ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)