

Xylopia ferruginea (Hook.f. & Thomson) Baill.

ทุเรียนนก (กรายขนแดง)

วงศ์ ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูง 30 ม. ใบขอบขนาน กว้าง 3.5-6 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายแหลม โคนกลมถึงรูปหัวใจตื้น เบี้ยว เนื้อคล้ายหนัง เกลี้ยงมันด้านบน เส้นใบ 10-14 คู่ ก้านใบยาว 0.5 ซม. กิ่งอ่อนมีขนสีสนิม ดอกเดี่ยว หรือ 2-3 ดอกบนก้านช่อดอกยาว 2.5 มม. ก้านดอก ยาว 8-15 มม. กลีบดอกสีสนิม เกสรเพศเมียหลายอัน ผลกว้าง 0.6 ซม. ยาว 5-11 ซม. มีหลายผลอยู่ด้วยกัน แหลมทั้งสองด้าน คอดระหว่างเมล็ด มีขนสนิมเมื่ออ่อน เมล็ด 6-8 เมล็ด พบในป่าดิบและป่าพรุน้ำจืด



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่มที่ 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพผล : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/6943900064/in/photostream/>

ภาพใบ/ดอก : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3202>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

