

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้น กิ่งผลัดใบ ถึง 40 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมเทาอ่อน เรียบ ใบ 3-5 ซม. ยาว 8-18 ซม. รูปรี แคบรูปขอบขนาน ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนหู่ เนื้อหนาค่อนข้าง สีสเขียวเข้มและเกลี้ยงด้านบน ด้านล่าง มีเกล็ดสีทองแน่น เส้นใบจางทั้ง 2 ด้าน ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ปลายบวม มีเกล็ด ดอก ออกเป็นช่อสั้น (กระจุก) นิวซีแลนด์ 3-6 ดอก ตามกิ่งใหญ่ มักอยู่ใต้รอยแผลใบ กลีบเลี้ยงยาว 2-2.5 ซม. รูปประฆัง ด้านนอก มีเกล็ดสีตะกั่ว ด้านในเกลี้ยง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 3-4.5 ซม. รูปคล้ายช้อน โคนแคบ ม้วนกลับไปด้านหลัง เกสรตัวผู้เชื่อมเป็นหลอดยาว 4-6 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลุ่มไม่เท่ากัน สีแดงสด มีอับเรณูสีเหลือง อับเรณูเปิดโดยรูเปิด รังไข่ขนาดประมาณ 5 มม. อยู่ในหลอดเกสรตัวผู้ มีเกล็ดสีเหลืองแน่น ก้าน เกสรตัวเมียยื่นยาวผลเกสรตัวผู้ มีเกล็ดสีเหลืองแน่น ก้านเกสรตัวเมียไม่ชัด ผล ยาว 6-8 ซม. กลม มีหนามแหลมรอบด้าน ร่วงทั้งผล แตกเป็น 5 เสี่ยงบนพื้น แต่ละเสี่ยงมีเมล็ดใหญ่ 1-2 เมล็ด มันเป็นเงาไม่มีเนื้อ พบทั่วไปในป่าดิบชื้นที่ต่ำ ที่ยังไม่ถูกทำลาย จังหวัดระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต



ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลอ้างอิง : โชมอน การ์ดเนอร์, ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

