

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูง 10 ม. ใบ รูปไข่หรือขอบขนานแกมรี กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 4-15 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลม เนื้อคล้ายแผ่นหนังเกลี้ยง เมื่อแห้งสีน้ำตาลอ่อนทั้งสองด้าน เส้นใบเล็ก 5-10 คู่ แตกแขนงและเชื่อมติดกันใกล้ขอบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห เล็กนูน ก้านใบยาว 0.4-1 ซม. เกลี้ยง กิ่งสีขาวต่างจากก้านใบที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อแห้ง ดอกเพศผู้ ออก 3 ดอก ใต้ใบอ่อนที่เพิ่งแตกใหม่ ก้านดอกเกือบไม่มี กลีบเลี้ยงยาว 4-6 ซม. รูปหลอด ปลายจักตื้นเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4 แฉกไม่ซ้อนกัน มีขนด้านนอก กลีบดอกยาว 1-1.5 มม. โคนเป็นหลอดปลายจักลึก 1/4 ของความยาว กลีบรูปสามเหลี่ยม 4 แฉก เกลี้ยง ด้านนอก เกสรเพศผู้ 14-20 อัน รังไข่เป็นหมันมีขน ดอกเพศเมีย เป็นดอกเดี่ยว ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายจักลึกครึ่งของความยาวกลีบ เป็นแฉกพับ 4 แฉกไม่ซ้อนกัน มีขน กลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า เกสรเพศผู้เป็นหมัน 4 อัน รังไข่และก้านเกสรเพศเมีย ขนแน่น ผล กลมหรือแบน ขนาด 2.5-3 ซม. ไม่มีก้านผลหรือก้านผลใหญ่ ยาวประมาณ 0.3 ซม. ปลายบวมทั้งสองด้าน เมื่ออ่อนมีขนสีน้ำตาลทอง ร่วงง่าย กลีบเลี้ยงหนาแข็งเป็นแฉกสามเหลี่ยม 4 แฉก แผ่นหรือโค้งกลับพับจับ ขนสีสนิม มักพบบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน พินดา สิริสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ปานาคได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปท. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

