

ไม้ต้น

ไม้ผลัดใบหรือผลัดใบบางส่วน สูงถึง 18 ม. เรือนยอดเปิดแคบและแตกกิ่งไม่มาก ตั้งชั้นแต่ละกิ่งที่ปลายมีกระจุกใบคล้ายร่ม เปลือกสีเทาอ่อน มีช่องอากาศนูน แตกเป็นร่องตื้น ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ยาว 45-170 ซม. มีใบย่อย 7-16 คู่ ออกตรงข้ามหรือสลับมีอีก 1 ใบที่ปลาย รูปไข่ถึงรี กว้าง 6-12 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนห่อหรือกลม มักเบี้ยว ขอบเรียบ เกือบทั้งสองด้าน มีต่อมสีม่วงไม่มากนักตามเส้นกลางใบหรือตามซอกใบด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว 3-5 มม. ก้านข้อใบและแกนกลางใบเป็นสันด้านบน กิ่งใหญ่แข็ง สีเทา มีรอยแผลเป็นใหญ่ที่ใบร่วง มีช่องอากาศจำนวนมาก ดอก ยาว 5-8 ซม. สีเหลืองชุ่นถึงแดงอมเขียวอ่อนด้านนอก สีแดงชุ่นหรืออมม่วงด้านใน บานกลางคืน กลิ่นคล้ายสบู่ ออกเป็นช่อใหญ่แข็งตั้งตรง ยาว 60-130 ซม. ที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 2-2.7 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 2.5-4.5 ซม. ปลายเป็นพูไม่เท่ากัน 5 พู ติดแน่นเมื่อเป็นผล กลีบดอกเป็นรูปกรวยกว้าง มีพูหนา 5 พูยื่น เกสรเพศผู้ 4 อันเป็น 2 คู่ที่ไม่เท่ากัน ติดที่คอหอกกลีบดอก โคนเกสร ผล รูปใบหอกกลับ กว้าง 5-7 ซม. ยาว 30-45 ซม. แบน มีปีกแคบที่ปลายทั้งสองด้าน เมล็ดกว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. มีปีกบางใสค่อนข้างโค้ง พบทั่วไปในป่าร่วนหรือชายป่าดิบที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์เดนอร์, ไหมอน พินดา สิทธิสุนทร ก่องกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : <https://indobiobiodiversity.org/species/show/16764>