

ชื่อพื้นเมือง :

**ไม้ต้น**

ขนาดเล็กถึงกลาง ผลัดใบ สูง 30 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง ออกดอกพร้อมใบอ่อน เปลือกสีเทาถึงดำ แตกเป็นแผ่นบางๆ หรือเป็นร่อง ใบรูปไข่แคบถึงขอบขนาน พบน้อยที่เป็นรูปไข่กลับ กว้าง 2-8 ซม. ยาว 6-22 ซม. ปลายแหลมหรือค่อนข้างเรียวแหลม โคนแหลมถึงกลมหรือรูปหัวใจตื้น เบี้ยวเล็กน้อย กิ่งอ่อนสีเขียวอ่อน มีขนละเอียดสีขาวแน่น ใบแก่คล้ายแผ่นหนังเขียวเป็นมันและเกลี้ยง ยกเว้นบนเส้นกลางใบด้านบน ด้านล่าง มีขนแล้วเกลี้ยง เส้นใบ 9-13 คู่ มีเส้นใบสั้นแซมกลาง ก้านใบยาว 1-5 ซม. กิ่งอ่อนมีขนแน่น ต่อไปเกลี้ยง ดอก สีเขียวอ่อนถึงสีครีมเมื่อยังอ่อน แล้วเริ่มมีจุดเป็นลายสีน้ำตาลแดง และเส้นกลางดอกสีแดงด้านใน กลิ่นหอมอ่อน ออกเดี่ยวหรือ 2-4 ดอก ก้านช่อดอกยาว 2-6 มม. ตามกิ่งใต้ตาใบ ก้านดอกยาว 0.5-2 ซม. มีใบประดับ ยาวถึง 3 มม. ติดใกล้โคนและครึ่งล่าง ร่วงง่าย กลีบเลี้ยงรูปปลี กว้าง 1-2 มม. ยาว 3-8 มม. สีเขียว แยกกัน ขอบโค้งขึ้นเล็กน้อย กลีบดอกวงนอกคล้ายกลีบเลี้ยง ยาว 4-12 มม. ร่วงเร็ว วงในรูปไข่แคบ กว้าง 1.8-3 ซม. ยาว 0.6-1.5 มม. ปลายแหลม โคนเป็นถุงโค้งเรียงหลวมๆ มักบิดเล็กน้อย ขอบโค้ง มีขนละเอียดสีอ่อนที่โคน ด้านนอกและตามขอบ เส้นกลีบชัด มีหยดของน้ำหวานตามเส้นกลางกลีบด้านใน เกสรเพศผู้เป็นหมัน 40-65 อัน บางทีมีเกสรเพศผู้สมบูรณ์ ไม่ก็อัน เกสรเพศเมีย 17-45 อัน เกลี้ยงหรือมีขน ผล กลมหรือค่อนข้างรูปไข่ กว้าง 1.2-2 มม. ยาว 1.5-2.5 มม. ปลายทุ่เกลี้ยง สีเขียวสด สุกสีอมเหลือง ก้านผลยาว 1-2.4 มม. มีถึง 20 ผลอยู่บนก้านช่อแข็ง ยาวประมาณ 2.5 ซม. มี 2-5(8) เมล็ด ยาว 6-10 มม. รูปรีแบนด้านเดียวหรือทั้งสอง ด้าน พบกระจายในป่ากึ่งผลัดใบ หรือตามชายป่าดิบ ตามหินริมน้ำ สูงถึง 250 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี