Syzygium curtisii (King) Merr. & L.M.Perry

ฝาดยอดแดง

วงศ์ MYRTACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น หรือพบน้อยเป็นไม้พุ่ม ไม่ผลัดใบ เมื่อแก่มักมีพูพอน พบน้อยมียางค้ำยัน เปลือก เรียบถึงแตกมักเป็นเกล็ดบางคล้ายกระดาษ ใบ ออกตรงข้าม หรือพบบ้างออกเป็นวงรอบข้อ ขอบเรียบ เส้นใบ 16-25 คู่ เส้นขอบใบ 1 เส้น ไม่มีหูใบ ดอก สีขาวถึงเขียวอ่อนหรือออกเหลือง ขนาดเล็ก ดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ กลีบดอก 5-6 กลีบ ไม่มีก้าน ดอกถ้วยฐานดอกสูงประมาณ 3 มม. กลีบดอกยาว 1.5-4 มม. เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียยาว 4-13 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-7 มม. ผล ทรงกลมถึง รูปไข่หรือทรงลูกข่าง ปลายมักบุ๋ม มีกลีบเลี้ยงติดทน เมื่อสุกสีขาว หรือดำอมม่วงแดง เนื้อหนาแน่นถึงเนื้อนุ่ม เมล็ดใหญ่ 1-2 เมล็ด พบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี