

Alangium rotundifolium (Hassk.) Bloemb.

ฝาละมีเล็ก

CORNACEAE

ไม้ต้น สูง 18(28) ม. กิ่งเล็กห้อยลง เป็นลักษณะเขี้ม เกลี้ยง มีช่องอากาศชุม เป็นร่องในมีจุดสีดำและครีม ในรูปไข่หรือกลม กว้าง 4-15 ซม. ยาว 4-20 ซม. ปลายแหลมสั้น ขอบเป็นพูหรือจักซี่ฟันค่อนข้างใหญ่ เกลี้ยง หรือมี ขนบนเส้นกลางใบด้านล่าง ในแก่นบางคล้ายกระดาษ ด้านล่างมีขนสีทองนุ่มนวล และบนเส้นกลางใบด้านบน เส้นใบข้าง 4-7 คู่ เส้นร่วงแทบใช้ชัด ก้านใบยาว 1.3-4 ซม. มีขนแน่น ดอก ขนาด 1-1.8(2.4) ซม. สีเหลืองอ่อน แล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มแก่ กลิ่นหอม ออกรสเป็นชื่อแตกกิ่ง มี 5-18 ดอก ก้านช่อยาวถึง 4 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. ติดดอกทรงแจกันโคนป่องชัด หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3 มม. ปลายหลอดแยกเป็นแฉกเล็กๆ ยาวประมาณ 0.5 มม. มีขนแน่น กลีบดอก 7-9 กลีบ ยาว 17-28 มม. บิดและม้วนไปด้านหลัง ด้านนอกมีขน ด้านในมีขนที่ครึ่งล่าง เกสรเพศผู้ 7-9 อัน ยาว 15-25 มม. ไม่มีหนาที่โคน มีขนสีเงิน แน่น ส่วนที่แกนอับเรณูมีขน ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 14-23 มม. เกลี้ยง ฐานฐานดกสูงประมาณ 2 มม. มีสัน ผล ขนาด 1.7-2.8 ซม. ไม่มีขน มี 1 เม็ด พบร้าไว้ในควบสมุทรมาเลเซีย อาจพบในภาคใต้ด้วย



ข้อมูลอ้างอิง : ไรมอน การ์เดเนอร์ ศินดา สีหะอุนทร กองการค่า ขยายตัด น้ำป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1. – กรุงเทพฯ: โครงการจัดทำพืชป่าไฟ. 2558 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใน : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพต่อ : <http://www.chrm.frim.gov.my/Bio-Diversity-Databases/Gallery.aspx?page=383&keyword=Alangium%20rotundifolium>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

