

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้น สูงถึง 40 ม. เรือนยอดใหญ่แผ่กว้าง ลำต้นตรงแข็งแรง เส้นรอบวงยาวถึง 160 ซม. มีพูพอนใหญ่ สูงถึง 6 ม. เปลือก สีเทาอ่อน เรียบถึงแตก มีน้ำยางสีน้ำตาลแดง เปลือกในสีเหลืองอ่อนหรือสีชมพู กลิ่นหอมเหมือนผลไม้ ใบ ยาว 22-60 ซม. ออกดอกใกล้ปลายกิ่ง มักออกเป็นวงรอบข้อ ข้อละ 4 ใบ ใบย่อย 3-6 คู่ รูปไข่กว้างถึงใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 3-8 ซม. ยาว 5-20 ซม. ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลม โคนกลมหรือรูปหัวใจตื้น เบี้ยวเล็กน้อย ขอบจักซี่ฟันเล็กหรือเรียบ ใบแก่คล้ายหนังบาง สีเขียวเข้ม เกลี้ยงหรือมีขนเฉพาะบนเส้นกลางใบด้านบน ขนสั้นด้านล่าง ใบแห้งสีเขียวอมเทา เส้นกลางใบบนด้านบน ด้านล่างเห็นชัด เส้นใบ 17-25 คู่ โค้งนูนด้านบน เส้นใบและเส้นใบย่อยสานกันเป็นร่างแห แน่นด้านล่าง ทำให้มีหลุมคล้ายขนมแฉลบเส้นขนานชัด ก้านใบย่อยสั้นมากประมาณ 5 มม. ก้านช่อใบใหญ่แข็งแบนและบวมที่โคน ไม่มีหูใบ กิ่งใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 ซม.) มีรอยแผลเป็นใหญ่ที่ใบร่วงไป ตายอด 3-5 ซม. มีขน ดอก สีเขียวอ่อนหรือครีม เป็นช่อแคบที่ซอกใบบนหรือเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ดอกเพศผู้ขนาด 0.8 ซม. เป็นช่อแตกแขนงมีหลายดอก ยาวถึง 16 ซม. กลีบเลี้ยง ยาว 4 มม. เกสรเพศผู้ 6 อันแยกกัน ล้อมรอบจานฐานดอก ขนแน่น ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมียเป็นช่อแข็งไม่แตกแขนง ยาวถึง 9 ซม. กลีบเลี้ยง 4 มม. เกสรเพศผู้ 6 อันติดที่จานฐานดอก ขนแน่น รังไข่มีขน ผลใหญ่ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 6.5-8 ซม. สีน้ำตาลครีม รูปไข่หรือรี ปลายกลมทั้งสองด้านหรือแบน บวมเล็กน้อยที่ปลาย ก้านเกสรเพศเมีย 5 อัน ค่อนข้างกลมหรือเป็นสามเหลี่ยม เมื่อตัดขวาง เปลือกหนา ขนแน่นเมื่ออ่อน แล้วเริ่มหลุดไปหรือเกลี้ยงเมื่อแก่ กลีบเลี้ยง 4 ซม. รูปคล้ายจานรองถ้วย ผ่นผลชั้นในแข็งคล้ายหิน เป็น 3 มุม ภายในมี 1-2(3) เมล็ด พบน้อยในป่าดิบ สูงถึง 200 ม. มักขึ้นใกล้ลำน้ำ พบเฉพาะที่ จ.สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/36641213171>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

