

ไม้พุ่มขนาดเล็กหรือไม้ต้น สูงถึง 10 ม. แตกกิ่งดัดสะพรั่ง เปลือก สีครีมหรือสีเทา อ่อน มีช่องอากาศสีน้ำตาลอ่อน ใบ กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 8-18 ซม. มักออกแบนระนาบเดียว รูปไข่กลับ พบข้างรูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลมหรือค้อยๆเรียวแหลม โคนแคบหรือหู่ ขอบจักซี่ฟันละเอียดหรือค่อนข้างเรียบ กิ่งอ่อนเรียบ หรือมีขนเล็กน้อย ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบทั้งสองด้านหรือมีขนกระจายเฉพาะบนเส้นกลางใบด้านล่าง ไม่มีต่อม เส้นใบบาง 5-9 คู่ ไปจดกันที่ใกล้ขอบใบ เส้นร่างแหไม่สม่ำเสมอ ก้านใบยาว 0.3-1.5 ซม. หูใบรูปสามเหลี่ยมยาว 1-3 ซม. ติดทน กิ่งอ่อนเป็นร่องหรือค่อนข้างเรียบ ดอก สีขาว ออกเป็นกลุ่มแน่นที่ง่ามใบ เหนือง่ามใบหรือตามกิ่งที่ไม่มีใบ ช่อดอกรวมยาว 0.5-1.8 (2.5) ซม. ไม่มีรอยแผลแน่น ก้านดอกยาว 3-5 มม. มีรอยต่อ กลีบเลี้ยงยาว 1.2 มม. รูปไข่ ขนเล็กน้อยด้านนอก กลีบดอกกว้างประมาณ 1.5 มม. ยาวประมาณ 3 มม. รูปขอบขนาน บาง ขนเล็กน้อยด้านนอก อับเรณูมีรยางค์อันใหญ่ 1 อัน เล็ก 1 อัน รังไข่เรียบหรือมีขนกระจาย ก้านเกสรเพศเมีย เรียบ ผล ยาว 1.5-2.5 (4) ซม. บนก้านแข็ง สีเขียวสด รูปรี ที่โคนมีกลีบเลี้ยงกางออกติดอยู่หนาแน่น เกือบทั้ง มีเส้นร่างแห แตกกออกเป็น 3 เสี่ยง รูปรี แต่ละเสี่ยงมีเมล็ดสีน้ำตาล 1 หรือ 2 เมล็ด ขนาดประมาณ 8 มม. พบขึ้นในที่ร่มในป่าดิบชื้น อาจพบบนเขาหินปูนบ้าง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

