

ไม้ต้น

ขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ถึง 28 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นสีทองแดง โคนลำต้นมักเป็นร่องและบิด ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ มีรากโผล่ขึ้นจากดิน ต้นแก่มีพูพอนเป็นแผ่นเปลือกสีน้ำตาลอมครีมอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม เรียบถึง เป็นเกล็ด หรือแตกเป็นร่องเปลือกในสีครีมอมชมพูถึง สีส้มหรือน้ำตาลแดง ใบ กว้าง 2.5-8 ซม. ยาว 7-18(24) ซม. ออกห่างๆ ส่วนมากรูปรีถึงไข่กลับปลายแหลมถึงหู้ หรือกลม โคนแคบ ยอดอ่อนมีขนกำมะหยี่สีทองแดงแน่น ใบแก่เป็นมันด้านบน ด้านล่างมีขนละเอียดสีทองแดง หรือสีออกเทาแน่น แล้วค่อนข้างเกลี้ยง ยกเว้นบนเส้นใบ เส้นกลางใบด้านบนแบนและมีสันตรงกลาง เส้นใบ 6-13 คู่ เป็นวงและเชื่อมกันด้านบน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด หรือบางส่วนขนานกับเส้นใบ ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. ด้านบนค่อนข้างแบน มีขนขุยละเอียดสีน้ำตาลแดง ถึงค่อนข้างเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีขนขุยละเอียดสีน้ำตาลแดง แน่น ดอก สีเขียวอ่อนโปร่ง แสงถึงสีขาวครีม ดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศเมียออกเป็นกลุ่มมี 3-12 ดอก ตามง่าม ใบหรือใต้แผลใบ ก้านดอกยาว 2-6 มม. มีขนละเอียด สีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2.5 มม. ค่อนข้างกลม มีขนสีทองแดงกระจายด้านบนนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกยาวประมาณ 3 มม. (สั้นกว่ากลีบเลี้ยงในดอกเพศเมีย) แฉกกลีบรูปไข่กว้าง ยาว 1.5-2 เท่าของหลอดดอก เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2.5 มม. ก้านชูอับเรณูเล็ก ยาว กว่าอับเรณู รังไข่มีขนสีทองแดง ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยาวประมาณ 1.2 มม. ผลรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ หรือค่อนข้างกลม ยาว 1-1.5 ซม. ค่อนข้างจักเป็นพู 2-5 พู ผลอ่อนมีขนสีออกน้ำตาลแล้วเกลี้ยง เปลือกบาง สุกสีม่วงถึงดำ เมล็ด 1-2(5) เมล็ด พบทั่วไปตามชายฝั่งทะเลที่เป็นหินหรือทรายทั่วภาคใต้และลึกเข้ามาจากป่าชายเลนด้วย พบตามเขาหินปูน ป่าดิบที่ต่ำ สูงได้ถึง 200 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชนอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินทร์พรินดีแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://floraofsingapore.wordpress.com/2010/04/16/planchonella-obovata/>

