

หมอรั้ด

LAURACEAE

Litsea lancifolia (Roxb. ex Nees) Benth. & Hook. f. ex Villar

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูง 2-8 เมตร ออกดอกพร้อมแตกใบอ่อน เปลือกสีน้ำตาล เรียบ เปลือกในสีเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 2.5-5.5 เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร ออกตรงข้ามหรือกึ่งตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรีหรือใบหอก ปลายแหลมหรือเรียวแหลมสั้น โคนรูปลิ้น เนื้อคล้ายกระดาษหนึ่งถึงหนึ่งบาง เกือบด้านบนมีขนและมีขนถึงโคนข้างเกลี้ยงด้านล่าง เส้นกลางใบแบนหรือเป็นร่องเล็กน้อยด้านบน เส้นใบ 5-9 (13) คู่ จางหรือเป็นร่องเล็กน้อยด้านบน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดหรือคล้ายร่างแห จางทั้งสองด้านหรือค่อยข้างชัดด้านล่าง ก้านใบยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เซนติเมตร สั้น ดอก ออกเป็นช่อคล้ายช่อกระจุกแน่น ยาว 0.5-1 เซนติเมตร ตามซอกใบและตามกิ่งไ้ร่อยแผลใบ แต่ละช่อซี่ร่มยาว 3-6 มิลลิเมตร ก้านช่อซี่ร่มยาว 2-5 มิลลิเมตร มี 3-5 ดอกต่อ 1 ช่อซี่ร่ม ก้านแต่ละดอกยาว 3-6 มิลลิเมตร มีขน ผล กว้าง 0.8-1.2 เซนติเมตร ยาว 1-2.4 เซนติเมตร รูปไข่ถึงรีแคบ ปลายแหลม แก่สีม่วงเข้มถึงดำ กลีบรวมตัว เห็นไม่ชัด เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 3-6 มิลลิเมตร

พบในป่าดิบที่ต่ำและที่สูง สูง 100-1700 เมตร จังหวัด ระนอง นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤต. ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/reulim/45959436862/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)