

หนอนชี้ควายใบเล็ก

Gironniera parvifolia Planch.

CANNABACEAE

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้นขนาดเล็กหรือกลาง 12 (20) ม.เปลือก สีเทา เปลือกในสีน้ำตาลอ่อนถึงสีออกชมพู ใบ รูปหอกแกมรีกว้าง 3-5 ซม. ยาว 7-15 ซม.(3-3.5 เท่าของความกว้าง) ปลายเรียวแหลม โคนแหลมหรือทู่กลม ไม่เบี้ยว ขอบเรียบหรือจักซี่ฟันละเอียดไปยังปลาย ใบอ่อนสีออกชมพู ใบแก่คล้ายหนังบาง เกือบหรือมีขนสีน้ำตาลอมเหลืองบนเส้นใบหลักด้านล่าง เส้นกลางใบและใบแบน เส้นใบ 6-8 คู่ ทำมุมแหลมชัน โค้งและเชื่อมกัน ใกล้ขอบใบ ก้านใบเล็กยาว 0.5-1 ซม. มีขนแล้วเกลี้ยง กิ่งเกลี้ยงหรือมีขนเมื่ออ่อน ตายอดรูปกรวยแคบ ยาว 1-1.6 ซม. หูใบคล้ายใน *G.subaequalis* ดอก ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่ต่างซอร่วมต้น ตามง่ามใบบนๆ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อเล็ก ไม่แตกแขนง ห้อยลง ยาว 5-8 ซม. มี 10-30 ดอก ดอกขนาด 1-3 มม. ออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มมี 3-5 ดอก กลีบรวมรูปไข่กว้างยาว 1-2.5 มม. เกสรเพศผู้ 5 อันยาว 1.7-2.5 มม. เกสรเพศเมียเป็นหมันยาวได้ถึง 0.5 มม. มีขนแน่นดอกเพศเมียเป็นช่อเล็กยาว 4-10 ซม. มี 1-5 ดอกขนาด 2-3 มม. กลีบ รวม 4 กลีบ ยาว 1.5-2.5 มม. รังไข่ขนาด 2-3 มม. ยอดเกสรเพศเมียแผ่ยาวได้ถึง 1.5 มม. มีขน ผล รูปไข่แคบ กว้าง 0.5 ยาว 0.8-1.2 ซม. มีก้านเกสร เพศเมีย คล้ายเส้นด้ายยาวได้ถึง 2.5 ซม. ออก เดี่ยวหรือมี 2-3 ผลอยู่ ด้วยกัน ก้านผลยาว 3-5 ซม. มีขนเมื่ออ่อนต่อไปเกลี้ยง สีเหลืองอ่อน พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาสได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

