

เงาะขันสันใบใหญ่

SAPINDACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10(36) ม. เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดง เรียบหรือมีช่องอากาศเล็ก ใน ประกอบแบบขนนกปลายคู่ โคนเท่ากัน ขอบเรียบ ยอดอ่อนมีขนแน่น ในย่อยไม่มีตุ่มใบ ดอก สมมาตร ดอกเพศผู้ และดอกสมบูรณ์เพศอยู่คู่คละตัน (พบน้อยต้นเดียวกัน) ออกเป็นช่อ กลีบเลี้ยง 5 (พบน้อย 4 หรือ 6) กลีบ ไม่เท่ากัน รูปสามเหลี่ยม โคนเชื่อมกัน กลีบดอก 4-6 กลีบ หรือไม่มี เกสรเพศผู้ 4-10 อัน ล้อมรอบด้วย JANฐาน ดอกวงแหวน รังไข่ก้านสัน มักมีตุ่มและชน ผล 1(2) พู มีหัวนมนุ่มๆ (คล้ายผลเงาะ) ผลมีหัวนมยาวมากกว่า 2 ซม. ผลกว้าง 2-4 ซม. บางทีเกลี้ยงหรือมีตุ่น แก่แตก เมล็ดมีเนื้อหุ้ม พบรากใต้



ข้อมูลอ้างอิง : ก้าวเดินร., ใหม่อน ไปป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อวิริพัทรวินิจฉัยแอนด์พับลิชิชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพหลักใน : https://www.flickr.com/photos/ys_yeoh/7447198350/in/photostream/

ภาพพาร์ทบุ๊ก/ผล : <https://seedsofborneo.com/2018/12/19/nephelium-cuspidatum-primate-dispersed/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

