

ไม้ต้นเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 10 เมตร (ถึง 25 เมตร ในคาบสมุทรมมาเลเซีย) เปลือก สีครีมอมส้มถึงสีน้ำตาลอมเทา เรียบถึงลอกเป็นแผ่นหรือแตกเป็นแผ่นตื้น ใบ กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ออกตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ปลายและโคนแหลม เนื้อคล้ายกระดาษหนึ่งหรือหนึ่งบาง เกือบทั้งสองด้านหรือมีขนกระจายบนเส้นใบด้านล่าง ใบแห้งสีน้ำตาลเข้ม เส้นใบ 6-13 คู่ แบนหรือนูนด้านบน ก้านใบยาว 0.5-2 เซนติเมตร ตายอดแบน หูใบรูปรี มีสันตรงกลางชัด ร่วงเร็ว ดอก สีขาวออกเหลืองถึงสีส้มอ่อน ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อกระจุกกลมแน่น ขนาด 1.2-1.6 เซนติเมตร (ผ่านกลีบดอก) ก้านช่อดอกเล็กเรียว ยาวได้ถึง 3 เซนติเมตร ออกเดี่ยวที่ปลายกิ่ง แต่ละดอกเรียงเชื่อมติดกัน พูกลีบเลี้ยง 4-5 พู ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ปลายพู่มีขนเล็กน้อย กลีบดอกรูปแตร หลอดกลีบยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ปลายเป็นพู 4-5 พู ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ปิดในดาดอก เกือบ อับเรณู 4-5 อัน ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ไม่มีก้านชูอับเรณู ติดที่ปลายดอกและแผ่พื้นหลอดดอกเล็กน้อย ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-6 มิลลิเมตร มียอดเกสรเพศเมียรูปกระสวย ผล ออกเป็นกระจุกกลมแน่น ขนาด 1-2 เซนติเมตร แข็งไม่แตก เมล็ดรูปรี ไม่มีปีก

พบขึ้นใกล้ลำน้ำในป่าดิบที่ต่ำ สูงได้ถึง 200 เมตร และป่าพรุน้ำจืด จังหวัด ระนอง พังงา ปัตตานี นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี