

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น ผลัดใบช่วงสั้น สูงถึง 25 ม. ทรงต้นเมื่ออายุยังไม่มากรูปเจดีย์ โดยมีกิ่งเรียงเวียนแบนเป็นชั้นในแนวราบ ต้นแก่ลำต้นใหญ่ โค้งงอ เรือนยอดไม่เป็นระเบียบ แต่ยังคงแตกกิ่งด้านข้างชัด เปลือก สีครีมถึงสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตื้นและเป็นชั้นเล็กๆ เปลือกในสีน้ำตาลอมชมพู ยอดอ่อนปกคลุมด้วยขนคล้ายเส้นไหมสีทองแน่น ใบ แก่คล้ายแผ่นหนังเกลี้ยงและเป็นมันด้านบน ด้านล่างเกลี้ยง พบน้อยที่มีขนละเอียดเมื่อแห้งมีสีน้ำตาลเล็กน้อย ทั้งสองด้าน ใบ รูปไข่กลับหรือพบบ้างรูปรีกว้าง 8-15 ซม. ยาว 12-25 ซม. ปลายทู่หรือแหลมสั้น ค่อยๆสอบไปยังโคนกลมหรือโคนกึ่งรูปหัวใจ เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน ใบแก่สีแดงสด เส้นใบ 6-9(13) คู่ อยู่ห่างกัน จมด้านบน โค้งและหายไปใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห มักมีตุ่มที่ซอกเส้นใบ ก้านใบยาว 0.5-1.2 ซม. สั้นและใหญ่ มักมีขนละเอียด มีต่อมไม่ชัดที่ปลายก้านใบหรือที่โคนใบ กิ่งใหญ่ (หนาประมาณ 8 มม. ที่ปลาย) มีรอยแผลเป็นที่ใบหลุดไปขนาดใหญ่ ดอก สีขาวหรือสีเขียวยอมเหลืองอ่อน มีกลิ่น ออกเป็นช่อเชิงลดไม่แตกแขนง ยาว 8-16 ซม. ตามง่ามใบบนๆ ดอกส่วนมากเป็นดอกเพศผู้ ก้านดอก ยาว แต่ดอกล่างในช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงโคนรูปถ้วยตื้น ปลายเป็นพู่สามเหลี่ยม ยาว 1-1.5 มม. มักเกลี้ยง เกสรเพศผู้ยาว 2.5 มม. ก้านชูอับเรณูเกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 2 มม. เกลี้ยง ผล รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 2-5 ซม. ยาว 3.5-7 ซม. ค่อนข้างแบนมีสันแคบที่ขอบทั้งสองด้าน สีเขียวสดเมื่อสุกสีเหลืองหรืออมแดง เกลี้ยงและเป็นมันด้านบน ด้านในเนื้อคอร์ก มีรูอากาศทั่วไป ผนังผลชั้นในใหญ่แข็ง พบตามชายหาดทรายหรือโขดหิน ชายฝั่งอันดามัน นิยมปลูกตามสองข้างถนนทั่วประเทศ

ข้อมูลอ้างอิง : ไข่มอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ไธผาคดี เล่ม 1 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=3181>