

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 15 ม. ไม่ผลัดใบ เปลือก สีเทาถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือแตกสะเก็ด ใบ กว้าง 5-16 ซม. ยาว 12-32 ซม. ออกตรงข้าม ใบในแต่ละคู่ไม่เท่ากัน รูปไข่กลับถึงใบหอกกลับ ปลายทุ้งแหลมสั้น สอบแคบไปยังโคน เนื้อใบคล้ายกระดาษหนังถึงหนังบาง เกือบหรือมีขนสั้นไหมบนเส้นใบด้านบน มีขนสั้นไหม โดยเฉพาะบนเส้นใบด้านล่างหรือค่อยๆเกลี้ยง เส้นใบ 12-16 คู่ ชัด เส้นใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 1.2-3 ซม. มีขน หูใบยาวได้ถึง 2.5 ซม. รูปไข่หรือใบหอก ขอบตามส่วนล่างเชื่อมกัน ส่วนบนแยกออกทั้งรอยแผลคล้ายปลอกไว้ที่โคน ดอก สีขาวหรือครีม สมบูรณ์เพศ หรือดอกเพศเมีย ออกเป็นช่อกระจุกแตกแขนงเป็นง่าม มีหลายดอก ที่ปลายกิ่งข้าง(บางที่มียอดอ่อนอยู่ด้านบน คล้ายกับออกตามง่ามใบ)มีน้อยกว่า 10 ดอก ในช่อดอกเพศเมีย แต่มีได้ถึง 40 ดอกในช่อดอกสมบูรณ์เพศ (บานครั้งละ 1-4 ดอก) ก้านช่อดอกยาว 0.5-1.2 ซม. ขนละเอียด ไม่มีก้านดอกหรือก้านสั้นยาวได้ถึง 1.5 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 3.5-5 มม. ปลายเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 5 แฉก ยาว 0.5-1(2) มม. กลีบดอกคล้ายดอกเข็ม หลอดดอกยาว 8-12 มม. ปลายมี 5 แฉกรูปไข่ถึงขอบขนาน ยาว 4-6 มม. (ยาวน้อยกว่า ½ ของหลอดกลีบ) ปิดเวียนในตาดอก ทางออกเมื่อดอกบาน ด้านนอกมีขนสั้นไหมแน่น (รวมหลอดกลีบด้วย) อับเรณูแคบ 5 อัน ยาว 6-8 มม. ก้านชูอับเรณูสั้น ยาวน้อยกว่า 1 มม. ติดที่ส่วนบนของหลอด ไม่โผล่พ้นหลอด ก้านชูเกสรเพศเมียยาว 6-8 มม. ยอดเกสรเพศเมียรูปลูกข้าง ยาวเกือบเท่าก้านเกสรเพศเมีย ไม่โผล่พ้นหลอด ผล ขนาด 2.5-4 ซม. ก้านผลยาวได้ถึง 1 ซม. ทรงกลมหรือรูปไข่กว้าง มีหลอดกลีบเลี้ยงติดทนสูงประมาณ 6 มม. ค่อนข้างมีสันมีขนขาวสั้นไหมเมื่ออ่อน แล้วค่อนข้างเกลี้ยง เปลือกหนา มี 2 ช่อง ไม่แตก เนื้อแน่น เมล็ดแบน รูปไต จำนวนมาก ขนาดประมาณ 5 มม. พบในที่ค่อนข้างโล่ง ในป่าดิบต่ำและป่าร่วน สูง 100-500 ม. จ.สงขลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โจนอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 890 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3098>

