

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 15 ม. พบน้อยสูงได้ถึง 30 ม. อาจมีพุ่มหนึ่ย เปลือก สีน้ำตาลอมเทา ถึงน้ำตาลแดง เรียบหรือเป็นสะเก็ดละเอียด เปลือกในสีชมพูอมส้มถึงสีออกแดง มีน้ำเลี้ยงสีดงอมส้ม ประปราย ใบ กว้าง 2.5-10 ซม. ยาว 9-30 ซม. รูปขอบขนานถึงรูปไข่กลับแคบหรือใบหอกกลับ ปลายหู่หรือแหลมสั้น ค่อยๆสอบแคบไปยังส่วนล่าง โคนกลม หรือพบน้อยก็รูปหัวใจใบแก่มักมีสีออกเทา (มีนวล) และมีตุ่มเล็กๆด้านล่าง มีขนแตกกิ่งสีน้ำตาลอมส้มติดทน ยาวประมาณ 1 มม. (ทุกเส้นเหมือนกันทั้งขนาด และรูปร่าง) เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 12-28 คู่ แบนหรือเป็นร่องด้านบน (อย่างน้อยเส้นล่างๆ) เส้นใบ ย่อยละเอียดแต่เห็นได้ชัด ก้านใบยาว 1-2 ซม. ลำ มีขนหยาบเมื่ออ่อน แล้วเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว 2-5 มม. มีขนหยาบแน่นสีน้ำตาลอมส้ม ยาว 0.5-2 มม. แก่แล้วเกลี้ยงแต่ไม่แตกหรือลอก ดอกเพศผู้สีชมพู ถึงแดงเข้มด้านใน ออกเป็นช่อธรรมดาหรือแตกเป็นง่าม ยาวได้ถึง 7 มม. ไม่มีก้านช่อดอก (หรือยาวไม่เกิน 0.5 มม.) มี 5-20 ดอก ก้านดอกยาว 2-5 มม. าดดอกกว้าง 2-4 มม. ยาว 4-6 มม. ทรงรูปไข่กลับ จักประมาณ ครึ่งหนึ่ง ออกเป็น 3 พูหนา ปลายโค้ง มีขนสีสนิมแน่นด้านบนนอก ขนยาว 0.5-2 มม. งานเกสรเพศผู้มีเส้นผ่า ศูนย์กลางยาว 1-1.5 มม. บนเส้าเกสรเพศผู้เรียวยาวแหลม ยาว 1.5-2.5 มม. กลมหรือกึ่งสามเหลี่ยม ตรงกลาง แบนหรือเว้าตื้น อับเรณู 6-9 อัน ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้ยกเว้นช่อดอกมี 3-8 ดอก ก้านดอกยาวไม่เกิน 1 มม. าดดอกทรงขอบขนานแกมรูปไข่ ก้านเกสรเพศเมียเล็กเรียวยาว ยาว 1.5-2 มม. ยอดเกสรเพศเมียเป็น 8 พู ผล กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. ก้านผลลำ ยาวได้ถึง 0.5 ซม. มี 1-5 ผลอยู่ด้วยกัน ทรงรูปไข่ถึงรีกว้าง มักมีสันนูน มีขนหยาบติดทนแน่นสีสนิม ยาว 1-3 มม. พบในป่าดิบเดิมหรือป่าถูกทำลาย สูงได้ถึง 1000 ม. จ.ระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <http://www.natureloveyou.sg/Knema%20laurina/Main.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

