

หยีทองบั้ง

FABACEAE

Dialium platysepalum Baker

ไม้ต้น ผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 30 เมตร ลำต้นเล็กปัด เรือนยอดแคบเปิด ต้นอายุมากมีพูพอนสูงชัน เปลือกสีน้ำตาลเทาอ่อนหรืออมชมพูเรียบหรือแตกเป็นแผ่นเล็ก เปลือกในสีน้ำตาลมีน้ำเลี้ยงใสเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อถูกอากาศ ใบ ยาว 10-25 เซนติเมตร ใบประกอบขนนก ยอดเดี่ยว ใบย่อย 2-3 คู่ ออกสลับถึงเกือบตรงข้าม กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรี ปลายเรียวแหลมสั้น โคนกลมถึงรูปลิ้ม ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง มีขนกำมะหยี่ละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองด้านล่าง (ต้องใช้แว่นขยาย) เส้นใบ 9-11 คู่ จางด้านล่าง ก้านใบย่อย ยาว 0.5 เซนติเมตร ไม่มีหูใบย่อย หูใบเล็ก ร่วงง่าย ดอก สีครีมหรือเหลืองอ่อน เป็นช่อแตกแขนง ยาว 12-20 เซนติเมตร ที่ปลายกิ่งและตามซอกใบบนๆ แกนกลางช่อมีขนเส้นไหม กานดอกยาว 2-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 5-6 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยมกว้าง มีขนกำมะหยี่ สีน้ำตาลแน่น ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้หนา 2 อัน ก้านชูอับเรณูสีขาว อับเรณูใหญ่สีเหลือง เป็นร่องรูปตัววี (V) ด้านนอก รังไข่มีขน กำมะหยี่สีดำ มีมีก้าน ก้านเกสรเพศเมียมีขนกำมะหยี่สีน้ำตาล ยกเว้นที่ปลาย ยอดเกสรเพศเมียไม่ชัด ผล กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2.5-3 เซนติเมตร รูปไข่ (กลับ) หรือกลม มีขนกำมะหยี่ สีน้ำตาลเข้มติดทน ไม่แตก มี 1 เมล็ด สีน้ำตาลอ่อน กลมหรือรูปไข่ ยาว 1-1.5 เซนติเมตร

พบป่าดิบสมบูรณ์ ใกล้ชายแดนมาเลเซีย



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤดี. ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/reulim/40795135874/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)