

ไ้แกรกใบขน

ไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 18 ม. เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องหยาบ ใบ กว้าง 5-7 ซม. ยาว 12-18 ซม. รูปขอบขนานแกมรีถึงกึ่งไข่กลับ ปลายเรียวแหลมสั้น โคนรูปกลม ขอบเรียบ ยอดอ่อนมีขนอ่อนสั้น ใบแก่ เนื้อบาง มีขนสีขาวโดยเฉพาะด้านล่าง เส้นกลางใบจมด้านบน เส้นใบประมาณ 8 คู่ ฐานด้านล่าง ก้านใบยาว 0.8-1 ซม. ขนละเอียด หูใบขนาดประมาณ 1-2 ซม. แบนไม่ซ้อนกัน กิ่งอ่อนกลวง มีขนเล็กบาง ดอก ขนาดน้อยกว่า 0.5 ซม. สีเขียวอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกธรรมดาหรือแตกแขนงสั้น มี 2-8 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 7 มม. เล็กเรียว มีขนละเอียด กลีบเลี้ยงยาว 8-12 มม. รูปขอบขนาน จักประมาณหนึ่งในสี่ของกลีบ เป็นพูสามเหลี่ยมตรง 5(6) พู ยาว 2-3 มม. สีเขียวอมเหลือง มีขนสั้นด้านบน ด้านในมีขนคล้ายขนแกะในครึ่งล่าง กลีบดอก 5(6) กลีบ ยาว 2-3 มม. ติดที่ขอบหลอดกลีบเลี้ยง สีขาว รูปไข่กลับ ขอบรุ่มมีรยางค์คล้ายเส้นด้าย ยาว 1-1.5 มม. ในครึ่งบน เนื้อบาง กางหรือโค้งกลีบ ร่วงเร็ว เกสรเพศผู้มี 8 อัน ติดที่ขอบของหลอดกลีบเลี้ยง สั้นและยาวสลับกัน งอ รั้งไข่ได้วงกลีบ 10 ช่อง เชื่อมกับหลอดกลีบเลี้ยงที่โคน มีสั้นเล็กน้อย ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 6-8 มม. ยื่นพ้นหลอดกลีบเลี้ยงเล็กน้อย มีขนละเอียดเฉพาะด้านล่างสองในสาม ยอดเกสรเพศเมีย คล้ายจานแยกเป็นพูเล็ก ผล ขนาดประมาณ 1 ซม. ออกได้แผลใบ ทรงลูกแพร์หรือมะเดื่อ พูกลิบลี้นง ติดทนที่ปลาย สีเหลืองออกเขียว เกลี้ยง ภายในมีเนื้อเมล็ดน้อยถึงหลายเมล็ด สีดำ ขนาด 1-1.5 มม. พบตามชายป่าดิบที่ต่ำ ไกลน้ำ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ: <http://www.npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/m-o-p-r/rhizophoraceae-132-lauraceae/showall=1>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

